

تاثیر مشابه دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش بهمراه امپرازول با سله کوکسیب در درمان آرتريت در بیماران با ریسک بالای گوارشی در طرح CONDOR

طرح CONDOR طرح تحقیقاتی آینده نگر، بمدت 6 ماه، دو سو کور در گروههای موازی، تصادفی، چند مرکزی جهت مقایسه 200 میلی گرم سله کوکسیب دو بار در روز با 75 میلی گرم دیکلوفناک آهسته رهش دو بار در روز بهمراه 20 میلی گرم امپرازول روزانه انجام گرفت. بیماران از نظر هلیکوباکتر پیلوری منفی بوده و استئوآرتريت یا روماتوئید آرتريت داشته، بالای 60 سال، با یا بدون تاربخچه ای از زخم معده یا اثنی عشر، یا بالای 18 سال داشته با سابقه زخم معده یا اثنی عشر. بیماران در هر ویزیت از نظر آرتريت ارزیابی می شدند.

نتایج:

4484 بیمار در دو گروه (2238 بیمار مصرف کننده سله کوکسیب) و (2246 بیمار مصرف کننده دیکلوفناک سدیم) بودند، در پایان مطالعه تعداد بیماران در هر گروه برابر بود با (1730 نفر در گروه سله کوکسیب و 1621 بیمار در گروه دیکلوفناک سدیم 72/2 %)، 82 درصد بیماران استئوآرتريت و 16 درصد روماتوئید آرتريت داشتند، کمپلیانس با دارو در هر دو گروه مشابه بود (0/99) در سله کوکسیب و (0/99) در گروه دیکلوفناک سدیم. متوسط مدت بیماری در بیماران استئوآرتريت 7/6 سال در گروه سله کوکسیب و 7/8 سال در گروه دیکلوفناک ، متوسط مدت بیماری در بیماران آرتريت روماتوئید 10/2 سال در گروه سله کوکسیب و 9/9 سال در گروه دیکلوفناک و بهبودی در هر دو گروه در ماههای 2، 4 و 6 یکسان بود. جدول ذیل خلاصه ای از ارزیابی بیماران در هر دو گروه می باشد.

Table 2.

Categorical Summary of Patients' Global Assessment of Arthritis Scores in Patients Enrolled in the CONDOR Trial Receiving Celecoxib or Diclofenac Plus Omeprazole

Visit	Category	Celecoxib 200 mg bid n (%)	Diclofenac 5R 75 mg bid Plus Omeprazole 20 mg qd n (%)
Screening	Good/Very good	280 (12.7)	285 (12.9)
	Fair	1315 (59.7)	1328 (60.1)
	Poor/Very poor	608 (27.6)	598 (27.0)
Baseline	Good/Very good	237 (10.7)	226 (10.2)
	Fair	1286 (58.3)	1311 (59.2)
	Poor/Very poor	684 (31.0)	676 (30.5)
Month 1	Good/Very good	877 (42.7)	940 (46.1)
	Fair	985 (47.8)	939 (46.1)
	Poor/Very poor	194 (9.4)	160 (7.8)
Month 2	Good/Very good	1021 (52.0)	999 (53.3)
	Fair	815 (41.5)	756 (40.3)
	Poor/Very poor	129 (6.6)	121 (6.4)
Month 4	Good/Very good	1037 (56.9)	1001 (58.1)
	Fair	683 (37.5)	630 (36.6)
	Poor/Very poor	101 (5.5)	92 (5.3)
Month 6	Good/Very good	1214 (57.0)	1204 (57.6)
	Fair	737 (34.6)	723 (34.6)
	Poor/Very poor	179 (8.4)	163 (7.8)
Final (LOCF)	Good/Very good	1250 (56.6)	1246 (56.3)
	Fair	770 (34.9)	789 (35.7)
	Poor/Very poor	187 (8.5)	178 (8.0)

LOCF=last observation carried forward.

گردآورندگان: خانمها پردیس حافظ تقوا و لیلا کاظمی و آقای پوریا حافظ تقوا نمایندگان علمی شرکت ایران نازو