

قرص انتریک کوتد مزالازین-ناژو ۵۰۰ مزالازین

هر قرص مزالازین-ناژو ۵۰۰ حاوی: ۵۰۰ میلی گرم مزالازین

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

موارد مصرف

بیماری التهابی روده ای، (پیشگیری و درمان)- مزالازین جهت درمان و حفظ بهبودی کولیت اولسراتیو یا بیماری کرون با شدت خفیف تا متوسط به کار می رود.

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با داروساز مشورت نمایید:

- حساسیت به اولسالازین، سولفاسالازین و یا سالیسیلات ها (از جمله آسپیرین)
- بارداری و یا شیردهی
- مصرف در کودکان و سالمندان

هشدارها

- ممکن است سطح آنزیم های کبدی (AST, ALT) و بیلی روبین افزایش یابد و با قطع یا ادامه درمان طبیعی شود.
- در صورت وجود اختلال عملکرد کلیوی یا تنگی پیلور فواید خطرات درمان بررسی شود (مزالازین موجب افزایش وقوع نفريت بينابينی و سندرم نفروتیک

می شود).

• قبل و حین درمان آزمایشات Bun, Creatinine و آنالیز ادراری انجام شود.

• اولیگواسپرمی و ناباروری در آقایان که در ارتباط با سولفاسالازین گزارش شده با مزالازین دیده نشده است.

• اسیدی شدن لومن کولون توسط لاکتولوز ممکن است آزادسازی مزالازین را مختل کند.

• امپرازول ممکن است pH دستگاه گوارش را افزایش دهد، مصرف همزمان این دو دارو ممکن است منجر به جذب بیشتر مزالازین شود.

• در صورت فراموش کردن هر وعده از دارو، بلافاصله بعد از به یاد آوردن دارو را مصرف کنید مگر اینکه نزدیک زمان نوبت بعدی باشد. توجه داشته باشید مقدار دارو در یک وعده را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز هر کدام از اثرات جانبی زیر بلافاصله به پزشک اطلاع دهید:

عوارض کمتر شایع: سندرم عدم تحمل حاد (درد یا کرامپ های شدید شکمی یا معده)، اسهال خونی، تب، سردرد شدید، راش جلدی و خارش.

توجه: در صورت بروز اولین علائم سندرم عدم تحمل حاد باید درمان با مزالازین سریعاً متوقف شود.

عوارض نادر: هپاتیت، پانکراتیت، پریکاردیت. در صورتی که عوارض زیر ادامه یابند و یا باعث ایجاد

ناراحتی در بیمار شوند به پزشک مراجعه شود:

عوارض شایع: کرامپ یا درد خفیف شکمی یا معده، اسهال خفیف، سرگیجه، سردرد، تهوع یا استفراغ، رینیت (التهاب مخاط بینی)، خستگی یا ضعف غیر عادی.

عوارض با شیوع کمتر و نادر: آکنه، آلورپیسی (ریزش مو)، آنورکسی (کاهش اشتها)، درد پشت یا مفصل، سوءهاضمه، نفخ.

مقدار و نحوه مصرف

قرص بطور کامل بدون خرد شدن یا جویده شدن بلعیده شود.

دارو قبل از غذا و در زمان خواب به همراه یک لیوان آب مصرف شود.

دوره درمان را کامل نمایید.

بدون مشورت با پزشک خود برند داروی مصرفی خود را تغییر ندهید.

جهت بررسی میزان بهبودی در فواصل زمانی منظم به پزشک مراجعه کنید.

ممکن است بیمار در مدفوع خود دانه های کوچک و یا قرص های خالی باقیمانده بعد از جذب دارو را مشاهده کند.

بین سرعت و محل جذب برندهای مختلف قرص انتریک کوتد مزالازین تفاوت هایی وجود دارد، به همین دلیل یک برند نباید جایگزین برند دیگری شود مگر در صورت صلاحدید پزشک.

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به شرح زیر است:

بزرگسالان: کولیت اولسراتیو یا بیماری کرون : ۵۰۰

میلی گرم سه بار در روز (یک نوبت ظهر و دو نوبت عصر) به مدت ۶ هفته.

درمان نگهدارنده کولیت اولسراتیو: ۵۰۰ میلی گرم سه بار در روز.

شرایط نگهداری

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

بسته بندی

هر بطری حاوی ۶۰ عدد قرص انتریک کوتد مزالازین-ناژو ۵۰۰ به همراه یک عدد سیلیکاژل کاغذی یک گرمی، در یک جعبه مقوایی بسته بندی می گردد.



ایران ناژو

تهیه شده در لابراتوارهای شرکت داروسازی بهداشتی آرایشی

ایران ناژو تهران - ایران

www.irannajo.ir

info@irannajo.com

تلفن انتقادات و پیشنهادات: ۰۲۱-۸۸۷۳۸۷۳۰-۹۸۲۱+

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۰۶۴۴-۹۸۲۱+