

کپسول خوراکی (گرانول های انتریک کوند) امپرازول – ناژو ۲۰
امپرازول

هر عدد کپسول امپرازول – ناژو ۲۰ حاوی:

امپرازول ۲۰ میلی گرم

لطفاً قبل از مصرف دارو، این بروشور را با دقت مطالعه نمایید زیرا حاوی اطلاعات مهمی برای شما است.

• اگر سؤال دیگری دارید، از پزشک یا داروساز خود بپرسید.

• این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

• در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی، حتی مواردی که در این بروشور ذکر نشده‌اند، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

مطالب این بروشور

۱.امپرازول– ناژو ۲۰ چیست و چه کاربردی دارد؟

۲.قبل از مصرف امپرازول – ناژو ۲۰ چه نکاتی را باید بدانید؟

۳.چگونه باید داروی امپرازول – ناژو ۲۰ را مصرف کنید؟

۴.عوارض جانبی احتمالی

۵.نحوه نگهداری دارو

۶.محتویات بسته و سایر اطلاعات

۱– امپرازول–ناژو ۲۰ چیست و چه کاربردی دارد؟

کپسول حاوی گرانول های انتریک کوند امپرازول، حاوی ماده‌ی فعال امپرازول است. این دارو به گروهی از داروها به نام «مهارکننده‌های پمپ پروتون» تعلق دارد. این داروها با کاهش میزان اسیدی که معده تولید می‌کند، عمل می‌کنند.

موارد مصرف:

• درمان بیماری رفلاکس معده به مری همراه یا بدون سوزش سر دل

• درمان زخم معده

• درمان زخم دوازدهه

• درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری همراه

با آنتی‌بیوتیک‌های تجویز شده

• پیشگیری از عود زخم ناشی از هلیکوباکتر پیلوری

• زخم‌های ناشی از مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (مانند ایبوپروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، ملوکسیکام و …)

• درمان سندرم زولینگر–الیسون که با ترشح بیش از حد اسید معده همراه است.

۲– قبل از مصرف امپرازول–ناژو ۲۰ چه نکاتی را باید بدانید؟

از مصرف دارو خودداری کنید:

• اگر به امپرازول یا داروهای دیگری از گروه مهارکننده‌های پمپ پروتون مانند پنتوپرازول، لانسوپرازول، رابپرازول یا اس امپرازول حساسیت دارید.

• اگر دارویی حاوی نلفیناویر مصرف

می‌کنید. (این دارو برای درمان عفونت HIV ویروس نقص ایمنی انسانی استفاده می‌شود).

توصیه ها و هشدار ها :

قبل یا حین مصرف فرآورده در صورت وجود هریک از موارد زیر با پزشک یا داروسازخود مشورت کنید:

• در صورت وجود هرگونه حساسیت به امپرازول، غذا ها، رنگ ها و مواد محافظت کننده

• در صورت حساسیت به داروهای دیگری از گروه مهارکننده‌های پمپ پروتون

• در صورت ابتلا به هر نوع بیماری از جمله بیماری های کبدی

• در صورت استفاده از هر نوع داروی دیگر (مثل فنی توئین و …)

• در صورت بارداری و شیردهی

• اگر بیش از سه ماه از امپرازول استفاده می‌کنید، ممکن است سطح منیزیم خون شما کاهش یابد. در صورت بروز علایمی مثل خستگی، انقباضات غیرارادی

سه ماه)

• در صورت سابقه واکنش پوستی ناشی از

داروهای کاهش‌دهنده اسید معده

• در صورت نیاز به انجام آزمایش

کرموگرانین A

• در صورت سابقه التهاب کلیه مرتبط با مصرف این داروها

در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر فوراً به پزشک مراجعه نمایید:

• بثورات پوستی به‌خصوص پس از قرار گرفتن در معرض نور خورشید

• درد مفاصل همراه با بثورات

• کاهش حجم ادرار یا وجود خون در ادرار

• اسهال شدید آبکی یا خونی همراه تب یا

درد شکم

• بروز عفونت شدید همراه تب و درد

مصرف طولانی‌مدت

• مصرف مهارکننده‌های پمپ پروتون بیش از یک سال ممکن است خطر شکستگی استخوان‌های لگن، مچ دست و ستون فقرات را اندکی افزایش دهد. در صورت ابتلا به پوکی استخوان یا مصرف کورتیکواستروئیدها، پزشک خود را مطلع نمایید.

• این دارو ممکن است بر نحوه جذب

ویتامین B_{۱۲} توسط بدن شما تأثیر بگذارد، به‌ویژه اگر لازم باشد آن را برای مدت طولانی مصرف کنید، در صورت بروز

علائمی مثل خستگی شدید یا کمبود انرژی، احساس سوزن‌سوزن شدن یا گزگز در دست‌ها یا پاها، درد یا قرمزی زبان یا

زخم‌های دهانی، ضعف عضلانی، اختلال در بینایی یا مشکلات حافظه، گیجی و

افسردگی با پزشک خود تماس بگیرید، ممکن است پزشک در صورت نیاز سطح

ویتامین B_{۱۲} شما را بررسی کند یا برای پیشگیری از کمبود آن، مکمل ویتامین B_{۱۲} تجویز کند.

• اگر بیش از سه ماه از امپرازول استفاده می‌کنید، ممکن است سطح منیزیم خون شما کاهش یابد. در صورت بروز علایمی مثل خستگی، انقباضات غیرارادی

عضلات، گیجی، تشنج، سرگیجه یا

افزایش ضربان قلب، فوراً پزشک خود را مطلع کنید. کاهش سطح منیزیم همچنین ممکن است باعث کاهش سطح پتاسیم یا کلسیم خون شود. پزشک ممکن است برای بررسی و پایش سطح منیزیم خون، انجام آزمایش‌های خون به‌صورت منظم را برای شما توصیه کند.

کودکان

مصرف این دارو در کودکان تنها با نظر پزشک امکان پذیر است.

سایر داروها و کپسول امپرازول–ناژو ۲۰

• اگر در حال مصرف داروی دیگری هستید، اخیراً دارویی مصرف کرده‌اید یا ممکن است دارویی مصرف کنید، حتماً پزشک یا داروساز خود را در جریان بگذارید. این موضوع شامل داروهایی که بدون نسخه پزشک تهیه می‌کنید نیز می‌شود.

• اگر هر یک از داروهای زیر را مصرف می‌کنید، حتماً پزشک یا داروساز خود را مطلع کنید:

• نلفیناویر، کتوکونازول، ایتراکونازول، پوزاکونازول، وریکونازول، دیگوکسین ، دیازپام ، فنی توئین ، داروهای رقیق‌کننده خون مانند وارفارین، ریفامپیسین ، آتازاناویر ،تاکرولیموس، سیلوستازول، ساکونیناویر

،کلوپیدوگرل ، ارلوتینیب، متوترکسات با دوز بالا، گل راعی(گیاهی)

بارداری و شیردهی

اگر باردار هستید، احتمال می‌دهید باردار باشید یا قصد بارداری دارید، پیش از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

امپرازول وارد شیر مادر می‌شود، اما در دوزهای درمانی معمول، بعید است که برای نوزاد اثر زیان‌باری داشته باشد. اگر در دوران شیردهی هستید، پزشک با توجه به شرایط شما تصمیم می‌گیرد که آیا مصرف

امپرازول برایتان مناسب است یا خیر.

رانندگی و کار با ماشین‌آلات

در صورت احساس خواب‌آلودگی، سرگیجه یا اختلال بینایی از رانندگی یا کار با ماشین آلات خودداری نمایید.

۳– چگونه باید داروی

امپرازول–ناژو ۲۰ را مصرف کنید؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین

می کند ولی مقدار و روش مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

همیشه دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.

بزرگسالان

• برای درمان علائم بیماری رفلاکس معده به مری مانند سوزش سر دل و برگشت اسید معده به مری:

۲۰ میلی‌گرم، یک بار در روز، به مدت ۴ هفته

• برای درمان زخم قسمت ابتدایی روده

باریک (زخم دوازدهه یا اثنی‌عشر):

۲۰ میلی‌گرم، یک بار در روز، به مدت ۴–۸ هفته

• برای درمان زخم معده:

۲۰ تا ۴۰ میلی گرم، به مدت ۸–۴ هفته

• برای پیشگیری از زخم ناشی از مصرف داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی

۲۰ میلی‌گرم در روز، در مدت مصرف داروی مذکور

• برای درمان زخم ناشی از عفونت با باکتری هلیکوباکتر پیلوری:

۲۰ میلی‌گرم، دو بار در روز، به مدت ۱۴–۱۰ روز همراه با آنتی‌بیوتیک ها

براساس دستور پزشک

• برای درمان ترشح بیش از حد اسید معده

ناشی از تومور لوزالمعده (سندرم

زولینگر–الیسون):

۶۰ میلی‌گرم در روز

• برای درمان ازوفازیت فرسایشی:

۲۰ میلی‌گرم، یک بار در روز، به مدت ۸–۴ هفته

*پزشک بر اساس وضعیت بیماری و نیاز

شما، مقدار دارو را تنظیم می‌کند و همچنین مشخص می‌کند که چه مدت باید امپرازول را مصرف کنید.

اطفال

• برای درمان علائم بیماری رفلاکس معده به مری مانند سوزش سر دل و

برگشت اسید معده به مری:

• کودکان زیر ۱ سال: فقط با تجویز پزشک مصرف گردد.

• کودکان با وزن ۱۰–۵ کیلوگرم:

۵ میلی‌گرم در روز

• کودکان با وزن ۲۰–۱۰ کیلوگرم:

۱۰ میلی‌گرم در روز

• کودکان با وزن بالاتر از ۲۰ کیلوگرم:

۲۰ میلی‌گرم در روز

• برای درمان ازوفازیت فرسایشی:

• کودکان زیر یک ماه: فقط با تجویز

پزشک مصرف گردد.

• کودکان با وزن ۵–۳ کیلوگرم:

۵/۲ میلی‌گرم در روز

• کودکان با وزن ۱۰–۵ کیلوگرم:

۵ میلی‌گرم در روز

• کودکان با وزن ۲۰–۱۰ کیلوگرم:

۱۰ میلی‌گرم در روز

• کودکان با وزن بالاتر از ۲۰ کیلوگرم:

*دوره درمان برای کودکان زیر یک سال

به مدت ۶ هفته و بالای یک سال به مدت ۸–۴ هفته می‌باشد.

• برای درمان زخم ناشی از عفونت با باکتری هلیکوباکتر پیلوری:

• کودکان با وزن ۲۵–۱۵ کیلوگرم:

۲۰ میلی‌گرم دو بار در روز

• کودکان با وزن ۳۴–۲۵ کیلوگرم:

۳۰ میلی‌گرم دو بار در روز

• کودکان با وزن بالاتر از ۳۴ کیلوگرم:

۴۰ میلی‌گرم دو بار در روز

*دوره درمان به مدت ۱۴ روز همراه با

آنتی بیوتیک های تجویز شده پزشک

می‌باشد.

بیماران مبتلا به بیماری کبدی

• میزان مصرف دارو در این بیماران باید تحت نظر پزشک تنظیم شود.

روش مصرف

• دارو ترجیحاً صبح یک ساعت قبل از صبحانه مصرف شود.

• کپسول را به‌طور کامل همراه با یک لیوان آب بلعید و از خرد کردن، جویدن و یا باز کردن آن خودداری کنید.

• در صورتی که بلعیدن کپسول برای شما یا کودکان دشوار است، می‌توانید کپسول را باز کنید و محتویات آن را مستقیماً همراه با مقداری آب قورت دهید، یا داخل آب

بدون گاز، یا یکی از آب‌میوه‌های اسیدی (مانند آب سیب، آب پرتقال یا آب آناناس)، یا پوره سیب بریزید. مخلوط را بلافاصله یا

حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از آماده کردن مصرف کنید. برای اطمینان از اینکه تمام دارو را مصرف کرده‌اید، میتوانید لیوان را با

مقداری آب بشویید و آن آب را نیز بنوشید. توجه کنید که گرانول ها در آب یا آب میوه حل نمی‌شوند بلکه پخش میشوند و نباید

جویده شوند.

• هر ۲۱–۱۹ عدد گرانول معادل ۵/۲

میلی گرم امپرازول

• هر ۴۱–۳۹ عدد گرانول معادل ۵

میلی گرم امپرازول

• هر ۸۱–۷۹ عدد گرانول معادل ۱۰

میلی گرم امپرازول

اگر بیشتر از مقدار تعیین شده داروی امپرازول – ناژو ۲۰ را مصرف کردید:

در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز

شده، سریعاً به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید و بسته دارو را همراه داشته

باشید.

اگر یک نوبت مصرف داروی

امپرازول – ناژو ۲۰ را فراموش

کردید:

به محض یادآوری مصرف کنید و اگر زمان

نوبت بعدی نزدیک است، از مصرف دوز فراموش‌شده صرف‌نظر کنید و از دو برابر کردن دوز دارو خودداری نمایید و بدون مشورت پزشک مصرف دارو را قطع نکنید.

۴– عوارض جانبی احتمالی

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض

ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

عوارض شایع

سردرد یا عوارض گوارشی (مانند: اسهال، درد معده، یبوست، نفخ و افزایش گاز روده، حالت تهوع، استفراغ، پولیپ‌های خوش

خیم معده)

عوارض با شیوع کمتر

تورم پاها و مچ پا، اختلال در خواب (بی‌خوابی)، سرگیجه، احساس گزگز یا مورمور شدن، خواب‌آلودگی، احساس چرخش محیط یا سرگیجه دورانی (ورتیگو)، تغییر در نتایج آزمایش‌های خون

مربوط به عملکرد کبد، بثورات پوستی، کهیر، خارش پوست، احساس ناخوشی عمومی و کاهش انرژی یا بی‌حالی

عوارض نادر

اختلالات خونی مانند کاهش تعداد گلبول

های سفید یا پلاکت‌ها، کاهش سطح

سدیم خون، احساس بی‌قراری یا تحریک

پذیری، گیجی یا سردردگی، افسردگی،

تغییر در حس چشایی، اختلالات بینایی

مانند تاری دید، خس‌خس سینه یا تنگی

نفس ناگهانی، خشکی دهان، التهاب داخل

دهان، برفک، ریزش مو (آلوپسی)، بثورات

پوستی در اثر قرار گرفتن در معرض نور

خورشید، درد مفاصل، درد عضلات، التهاب

شدید کلیه، افزایش تعریق

عوارض بسیار نادر

تغییرات در سلول‌های خونی، از جمله

آگرانولوسیتوز ((کاهش شدید گلبول‌های

سفید خون) در صورت بروز عفونت ها

همراه تب و درد حتماً پزشک را از مصرف

امپرازول یا هر داروی دیگری که استفاده

می‌کنید مطلع کنید)، رفتار پرخاشگرانه،

توهم، مشکلات شدید کبدی، اریتم مولتی

فرم، بزرگ شدن پستان‌ها در مردان

سایر عوارض

التهاب روده که می‌تواند باعث اسهال شود،

کاهش سطح منیزیم، کلسیم و پتاسیم

خون (در مصرف بیش از سه ماه)، بثورات

پوستی که ممکن است با درد مفاصل

همراه باشد.

*اگر هر یک از عوارض نادر یا بسیار نادر

را مشاهده کردید، مصرف امپرازول را فوراً

قطع کنید و بلافاصله با پزشک تماس

بگیرید یا به نزدیک‌ترین مرکز درمانی

مراجعه کنید.

۵– نحوه نگهداری دارو

• دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری

نمایید.

۶– محتویات بسته و سایر

اطلاعات

هر جعبه محتوی یک بطری پلاستیکی از

جنس HDPE و یا شیشه کهربایی رنگ

۱۴ عددی کپسول امپرازول – ناژو ۲۰

همراه بسته رطوبت گیر می‌باشد.



تهیه شده در لابراتوارهای شرکت داروسازی بهداشتی‌آرایشی ایران ناژو تهران – ایران

ایران ناژو تهران – ایران
www.irannajo.ir
info@irannajo.com

تلفن انتقادات و پیشنهادات:۰۸۷۲۸۷۳۰-۹۸۸۲۱+

فکس: ۰۶۴۴-۸۸۷۴۰۹۸۲۱+

Oral Capsule (E.C.Granules)
Omeprazole-Najo 20

Omeprazole

Each capsule of Omeprazole-Najo 20 contains: Omeprazole 20mg

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

What is in this leaflet

1. What Omeprazole-Najo 20 is and what it is used for
2. What you need to know before you take Omeprazole-Najo 20
3. How to take Omeprazole-Najo 20
4. Possible side effects
5. How to store Omeprazole
6. Contents of the pack and other information

1. What Omeprazole-Najo 20 is and what it is used for

Omeprazole-Najo 20 contains the active substance omeprazole. It belongs to a group of medicines called ‘proton pump inhibitors’. They work by reducing the amount of acid that your stomach produces.

Omeprazole is used to treat the following conditions:

- gastro-esophageal reflux disease’ (GORD).
- gastric ulcer
- duodenal ulcer

- ulcers which are infected with bacteria called ‘Helicobacter pylori’ with prescribe antibiotics
- Prevention of the recurrence of Helicobacter pylori-associated
- ulcers caused by medicines called NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs e.g. Ibuprofen, Naproxen, diclofenac, meloxicam, ets)
- too much acid in the stomach caused by a growth in the pancreas (Zollinger-Ellison syndrome).

2. What you need to know before you take Omeprazole-Najo 20

Do not take Omeprazole-Najo 20 if:

- you are allergic to omeprazole or other proton pump inhibitors (e.g. pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, esomeprazole)
- you are taking a medicine containing nelfinavir (used for HIV infection).

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before or during taking Omeprazole-Najo 20 if:

- you are allergic to omeprazole or any of the other ingredients such as colors, preservatives and foods and other proton pump inhibitors
- you have severe liver problems
- you take other drugs such as phenytoin
- you are pregnant or breast feeding
- you have vitamin B12 deficiency or long term use
- you have ever had a skin reaction after treatment with a medicine similar to Omeprazole that reduces stomach acid
- You are due to have a specific blood test (Chromogranin A).

- you have history of inflammation in your kidney

Talk to your doctor immediately if:

- you get a rash on your skin, especially in areas exposed to the sun especially after taking this class of medications.
- you have rash and joint stiffness.
- you experience decreased volume of urine or blood in your urine
- you experience severe or persistent diarrhea with pain and fever
- you experience severe infection with fever and pain

Long-term use

Long-term use of proton pump inhibitors (PPIs) for more than one year may slightly increase the risk of fractures of the hip, wrist, and spine. Inform your doctor if you have osteoporosis or are taking corticosteroids. This medicine may affect the way your body absorbs vitamin B12, particularly if it is taken for a long period. Therefore, if you notice any of the symptoms such as, Extreme tiredness or lack of energy, Pins and needles, Sore or red tongue, mouth ulcers, Muscle weakness, Disturbed vision, Problems with memory, confusion, depression, talk to your doctor. your doctor may check your vitamin B12 levels or prescribe vitamin B12 supplements if necessary to help prevent deficiency.

if you are on Omeprazole for more than three months it is possible that the levels of magnesium in your blood may fall. Low levels of magnesium can be seen as fatigue, involuntary muscle contractions, disorienta-

tion, convulsions, dizziness or increased heart rate. If you get any of these symptoms, please tell your doctor promptly. Low levels of magnesium can also lead to a reduction in potassium or calcium levels in the blood. Your doctor may decide to perform regular blood tests to monitor your levels of magnesium.

Children

This medicine should only be used in children if prescribed by a doctor.

Other medicines and Omeprazole

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. This includes medicines that you buy without a prescription.

Tell your doctor or pharmacist if you are taking any of the following medicines: nelfinavir, ketoconazole,itraconazole, posaconazole, voriconazole, digoxin, diazepam, phenytoin, medicines that are used to thin your blood, such as warfarin, rifampicin, atazanavir, tacrolimus, Hypericum perforatum, cilostazol, saquinavir, clopidogrel, erlotinib, methotrexate (in high doses)

Pregnancy and breastfeeding

If you are pregnant, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Omeprazole is excreted in breast milk but is not likely to influence the child when therapeutic doses are used. Your doctor will decide whether you can take Omeprazole if you are breastfeeding.

Driving and using machines

If you experience drowsiness, dizziness, or visual disturbances, do not drive or operate machinery.

3. How to take Omeprazole-Najo 20:

The dosage of this medicine is determined by your doctor. However, the usual dosage and method of administration are as follows:

Always take this medicine exactly as prescribed by your doctor.

adults

- To treat symptoms of GORD such as heartburn and acid regurgitation: 20 mg once a day for 4 weeks.
- To treat duodenal ulcer: 20 mg once a day for 4-8 weeks.
- To treat gastric ulcer: 20-40 mg once a day for 4-8 weeks.
- To prevent duodenal and stomach ulcers caused by NSAIDs: 20 mg once a day while taking this medicines.
- To treat ulcers caused by Helicobacter pylori infection: 20 mg twice a day for 10-14 days with antibiotics directed by your doctor.
- To treat too much acid in the stomach caused by a growth in the pancreas (Zollinger-Ellison syndrome): 60 mg daily.
- To treat Erosive esophagitis: 20 mg once a day for 4-8 weeks.

✳Your doctor will adjust the dose depending on your needs and will also decide how long you need to take the medicine for.

Pediatric

To treat symptoms of GORD such as heartburn and acid regurgitation:

- <1 year: safety and efficacy not established
- 5-10 kg: 5 mg PO qDay
- 10-20 kg: 10 mg PO qDay
- >20 kg: 20 mg PO qDay

To treat Erosive esophagitis:

- <1 month: safety and efficacy not established
- Aged 1 month to <1 year, may treat for up to 6 weeks
- 3-5 kg: 2.5 mg PO qDay
- 5-10 kg: 5 mg PO qDay
- >10 kg: 10 mg PO qDay

Aged 1-16 years, may treat for 4-8 weeks

- 5-10 kg: 5 mg PO qDay
- 10-20 kg: 10 mg PO qDay
- >20 kg: 20 mg PO qDay

To treat ulcers caused by Helicobacter pylori infection and to stop them coming back:

- 15 -25 kg: 20 mg twice daily.
- 25 -34 kg: 30 mg twice daily.
- >34 kg: 40 mg twice daily.

Patients with liver disease

The dosage in these patients should be adjusted by a physician.

Taking this medicine

- It is recommended that you take your capsules One hour before breakfast.
- Swallow your capsules whole with a glass of water and do not chew or crush the capsules and granules.

If you or your child have trouble swallowing the capsules, open the capsules and swallow the contents directly with some water or put the contents into a glass of still (non-fizzy) water, any acidic fruit juice (e.g. apple, orange or pineapple) or apple sauce. Then drink the mixture straightaway or within 30 minutes. to make sure that you have drunk all of the medicine, rinse the glass very well with some water and drink it. The solid pieces disperse in water or

juices and not soluble. do not chew or crush them.

- Every 19-21 pellets contain approximately 2.5 mg of omeprazole.
- Every 39-41 pellets contain approximately 5 mg of omeprazole.
- Every 79-81 pellets contain approximately 10 mg of omeprazole.

If you take more Omeprazole than you should

If you take more than the prescribed dose, seek medical attention immediately or contact your doctor. Take the medicine package with you.

If you forget to take Omeprazole

If you forget to take a dose, take it as soon as you remember it. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Do not stop taking Omeprazole without talking to your doctor.

4. Possible side effects

Every medicine, in addition to its intended therapeutic effects, may cause unwanted side effects, although not everybody experiences them.

Common side effects

- Headache
- effects on your stomach or gut: diarrhoea, stomach pain, constipation, wind (flatulence), feeling sick (nausea) or being sick (vomiting), benign polyps in the stomach

Uncommon side effects

- swelling of the feet and ankles
- disturbed sleep (insomnia)
- dizziness, tingling feelings such as “pins and needles”, feeling sleepy
- spinning feeling (vertigo)

- changes in blood tests that check how the liver is working
- skin rash, lumpy rash (hives) and itchy skin
- generally feeling unwell and lacking energy

Rare side effects

- blood problems such as a reduced number of white cells or platelets. This can cause weakness, bruising or make infections more likely
- low levels of sodium in the blood. This may cause weakness, being sick (vomiting) and cramps
- feeling agitated, confused or depressed
- taste changes
- eyesight problems such as blurred vision
- suddenly feeling wheezy or short of breath (bronchospasm)
- dry mouth
- an inflammation of the inside of the mouth
- an infection called “thrush” which can affect the gut and is caused by a fungus
- hair loss (alopecia)
- skin rash on exposure to sunshine
- joint pains (arthralgia) or muscle pains (myalgia)
- severe kidney problems (interstitial nephritis)
- increased sweating

Very rare side effects

- changes in blood count including agranulocytosis (lack of white blood cells)
- aggression
- seeing, feeling or hearing things that are not there (hallucinations)
- severe liver problems leading to liver failure and inflammation of the brain
- erythema multiforme muscle

weakness

- enlarged breasts in men

Not known side effects

- inflammation in the gut (leading to diarrhea)
- a reduction in magnesium,potassium or calcium levels (for more than three months)
- rash, possibly with pain in the joints

✳If you notice any of the rare or very rare but serious side effects, stop taking Omeprazole and contact a doctor immediately.

5. How to store Omeprazole

- Keep this medicine out of the reach of children.
- Store below 30°C and protect from light and moisture.

6. Contents of the pack and other information

Each package of Omeprazole-Najo 20 contains 14 capsules. The medicine is supplied in an amber glass container or a HDPE bottle.

REFERENCE

-https://www.medicines.org.uk/Patient Information Leaflet-2023

-Medscape drug information

-Up to date

Issue date: 08.2026



Iran Najo
IRAN NAJO PHARMACEUTICAL COMPANY
www.irannajo.ir
info@irannajo.com
Tel: +9821-88738730 Fax: +9821-88740644