

هر گرم پماد استریل چشمی لوتپردنول-ناژو ۰/۵٪ حاوی:

لوتپردنول اتابونات ۵ میلی گرم

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است.

لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف

آن به دیگران خودداری نمایید.

موارد مصرف

پماد استریل چشمی لوتپردنول-ناژو ۰/۵٪ یک

کورتیکواستروئید موضعی چشمی است که برای

کاهش التهاب و درد پس از جراحی‌های چشمی

تجویز می‌شود و به کاهش علائم التهابی ناشی از

جراحی چشم کمک می‌کند.

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو

در صورت مصرف سایر داروهای چشمی، پماد را

آخرین داروی چشمی مصرف نمایید.

قبل و بعد از مصرف، دست‌های خود را بشویید.

* قبل از مصرف این دارو، در موارد زیر با داروساز

مشورت نمایید:

• در صورت حساسیت به لوتپردنول، سایر

کورتیکواستروئیدها یا هر یک از اجزای فرآورده.

• در صورت ابتلا به عفونت‌های ویروسی، قارچی یا

باکتریایی چشم.

• در صورت ابتلا به گلوکوم (آب‌سیاه) یا سابقه

افزایش فشار داخل چشم.

• در صورت بارداری یا شیردهی.

هشدارها

• این دارو فقط برای مصرف چشمی است.

• در طول دوره درمان از لنز تماسی استفاده نکنید،

مگر با نظر پزشک.

• مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئیدها ممکن

است باعث افزایش فشار داخل چشم یا آسیب عصب

بینایی و اختلال در وضوح دید یا میزان بینایی شود.

در بیماران مبتلا به گلوکوم باید با احتیاط مصرف

شود.

• در صورت نیاز به مصرف بیش از ۱۰ روز، فشار

داخل چشم باید توسط پزشک کنترل شود.

• در بیماران دارای نازکی قرینه یا صلیبه، خطر

سوراخ شدن این بافت‌ها در صورت مصرف

کورتیکواستروئیدها وجود دارد.

• مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئیدها ممکن

است موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و خطر

بروز عفونت‌های ثانویه چشمی از جمله عفونت‌های

قارچی و باکتریایی را افزایش دهد. در عفونت‌های

عفونی حاد چشمی، این دارو ممکن است علائم

عفونت را پنهان کرده یا باعث تشدید عفونت موجود

شود. در صورت عدم بهبود علائم طی ۴۸ ساعت، به

پزشک مراجعه نمایید.

• مصرف این دارو پس از جراحی آب مروارید ممکن

است باعث تاخیر در ترمیم زخم گردد.

• کورتیکواستروئیدهای چشمی در بیماران با سابقه

هرپس سیمپلکس باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

این دارو ممکن است طول مدت بیماری و یا شدت

بیماری را افزایش دهد.

• در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف، به

محض یادآوری دارو را مصرف کنید، مگر اینکه زمان

نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت از دو برابر

کردن مقدار مصرف خودداری نمایید.

• تجویز اولیه دارو و همچنین ادامه درمان بیش از

۱۴ روز باید تنها توسط پزشک و پس از معاینه کامل

چشم انجام شود.

• از تماس نوک تیوب با چشم یا هر سطح دیگر

خودداری نمایید.

• **هشدار اختلال بینایی:** مصرف

کورتیکواستروئیدها ممکن است موجب تاری دید یا

سایر اختلالات بینایی شود. در صورت بروز هرگونه

اختلال بینایی، جهت بررسی علت و درمان مناسب

به پزشک مراجعه نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی

اطلاعات کافی در مورد میزان جذب این دارو پس از

مصرف چشمی در بارداری و شیردهی در دسترس

نیست، اما انتظار می‌رود این میزان بسیار ناچیز باشد.

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید

فقط در صورت تجویز پزشک و منافع در برابر

خطرات احتمالی سنجیده شود.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن

است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز

شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده

نمی‌شود. در صورت بروز هر کدام از اثرات

جانبی زیر بلافاصله به پزشک اطلاع دهید.

مصرف کورتیکواستروئیدها ممکن است باعث

افزایش فشار داخل چشم و افزایش احتمال ابتلا به

عفونت‌های ثانویه چشمی گردد. شایع ترین عارضه

گزارش شده در اثر مصرف این دارو التهاب چشم،

قرمزی ملتحمه، تورم قرنيه و درد چشم می‌باشد.

لازم به ذکر است که بسیاری از این عوارض ممکن

است ناشی از خود عمل جراحی چشم باشند و لزوماً

به مصرف دارو مربوط نباشد. شایع ترین عارضه غیر

چشمی سر درد می‌باشد.

در صورت بروز درد شدید چشم، کاهش و تاری دید،

قرمزی و تورم شدید چشم، ترشح غیر طبیعی و یا هر

واکنش حساسیتی دیگر مصرف دارو را قطع کرده و

فوراً به پزشک مراجعه نمایید.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین

می‌کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو

به شرح زیر می‌باشد:

حدود یک نوار ۱/۳ سانتی‌متری (نیم اینچ) از پماد را

بر روی ملتحمه چشم مبتلا قرار دهید. مصرف دارو

معمولاً روزانه ۴ بار، ۲۴ ساعت پس از جراحی چشم

آغاز شده و به مدت ۲ هفته اول پس از جراحی یا

طبق دستور پزشک ادامه می‌یابد.

روش مصرف

دست‌های خود را با آب و صابون بشویید، درپوش


تیوب را باز کنید. سر را کمی به عقب خم نمایید.

پلک پایین را به آرامی به سمت پایین بکشید.

مقدار توصیه شده از پماد را به آرامی روی

ملتحمه چشم بمالید. چشم را به آرامی ۱ تا ۲

دقیقه ببندید. درپوش تیوب را ببندید.



* در صورت مصرف سایر فرآورده‌های چشمی،

پماد را آخر استفاده کنید.

• موارد منع مصرف دارو

• حساسیت به لوتپردنول یا سایر کورتیکواستروئیدها

• عفونت‌های ویروسی قرنيه و ملتحمه

• عفونت‌های قارچی چشم

• عفونت‌های مایکوباکتریایی چشم

تداخلات دارویی

در صورت مصرف همزمان سایر فرآورده‌های

چشمی، حداقل ۵ دقیقه بین مصرف آن‌ها فاصله

بگذارید. پزشک یا داروساز را از تمام داروهای

مصرفی خود مطلع نمایید.

شرایط نگهداری

• در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری

شود.

• پس از هر بار مصرف، درپوش تیوب را محکم

ببندید.

• یک ماه پس از باز شدن درپوش تیوب، باقی مانده

دارو را دور بریزید.

• دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

بسته‌بندی

هر جعبه حاوی یک تیوب ۳/۵ گرمی پماد استریل

چشمی لوتپردنول- ناژو ۰/۵٪

می باشد.



ایران ناژو

تهیه شده در لابراتوارهای شرکت داروسازی بهداشتی.آرایشی

ایران ناژو تهران - ایران

www.irannajo.ir

info@irannajo.com

تلفن انتقادات و پیشنهادات: ۰۸۷۳۸۷۳-۹۸۲۱+

فکس: ۰۸۸۷۴۰۶۴۴-۹۸۲۱+

Sterile Ophthalmic Ointment
Loteprednol-Najo 0.5%

Loteprednol

Each gram of Loteprednol-Najo 0.5% Ophthalmic Ointment Contains:

Loteprednol Etabonate 5 mg

1.CATEGORY

Ophthalmic Corticosteroid

2.MECHANISM OF ACTION

Loteprednol etabonate is a topical ophthalmic corticosteroid that suppresses inflammation by inhibiting inflammatory mediators, reducing edema, capillary dilation, leukocyte migration and scar formation.

3.INDICATIONS

Loteprednol-Najo 0.5% Ophthalmic Ointment is indicated for:

Treatment of postoperative ocular inflammation and pain following ocular surgery.

4.PERCAUTIONS TO CONSIDER Sensitivity

Do not use this product if you are allergic to loteprednol, other corticosteroids, or any component of the formulation.

Before use of this product

Inform your physician or pharmacist if you have glaucoma, increased intraocular pressure, corneal thinning, eye infection, or a history of ocular herpes simplex.

While using this medication

- For ophthalmic use only.
- Wash hands before and after use.
- Do not wear contact lenses unless advised by your physician.
- Prolonged use of corticosteroids may result in increased intraocular pressure

(IOP), optic nerve damage, and impairment of visual acuity or visual field. Use with caution in patients with glaucoma.

- If use is required for more than 10 days, intraocular pressure should be monitored by a physician.

- Prolonged use of corticosteroids may suppress the immune response and increase the risk of secondary ocular infections, including fungal and bacterial infections. In acute ocular infections, corticosteroids may mask signs of infection or exacerbate existing infection. If symptoms do not improve within 48 hours, the patient should be re-evaluated.

- In patients with corneal or scleral thinning, there is a risk of perforation with the use of topical corticosteroids.

- Use after cataract surgery may delay wound healing.

- Ocular corticosteroids should be used with extreme caution in patients with a history of herpes simplex infection, as they may prolong the course and increase the severity of the disease.

- **Visual disturbance warning:** Corticosteroid use may cause blurred vision or other visual disturbances. If such symptoms occur, consult a physician for evaluation and appropriate management.

- **Missed dose:** If a dose is missed, apply it as soon as remembered unless it is almost time for the next scheduled dose. In that case, do not apply a double dose.

- Initial prescription and continuation of therapy beyond 14 days should only be carried out by a physician following a complete ophthalmic examination.

- Complete the full course of treatment.

- Avoid contact between the tip of the tube and the eye or any other surface to prevent contamination.

Do not use if

You have viral, fungal or mycobacterial infections of the eye unless specifically prescribed by your physician.

Pregnancy and Breastfeeding

There are no sufficient data available regarding systemic absorption of this drug following ophthalmic administration during pregnancy and breastfeeding; however, systemic absorption is expected to be very minimal.

Use of this medication during pregnancy and breastfeeding should be only under physician prescription, and the benefits of treatment should be weighed against the potential risks.

5.INTERACTIONS

Drug interactions

No clinically significant drug interactions are known. Inform your physician about all medicines you are using, especially other ophthalmic medications.

6. MEDICAL CONSIDERATIONS

Patients receiving treatment for more than 10 days should have intraocular pressure monitored. Long-term use may increase the risk of glaucoma, cataract formation, delayed wound healing and secondary ocular infections.

7. CONTRAINDICATIONS

Do not use this medicine in patients with:

- Hypersensitivity to loteprednol or other corticosteroids.
- Viral diseases of the cornea or conjunctiva (including herpes simplex keratitis).
- Fungal eye infections.

- Mycobacterial eye infections.

8. SIDE EFFECTS

Corticosteroid use may lead to increased intraocular pressure and an increased risk of secondary ocular infections. The most commonly reported adverse reactions associated with this medication include ocular inflammation, conjunctival hyperemia (redness), corneal edema, and eye pain. It should be noted that many of these adverse effects may be related to the surgical procedure itself rather than the medication. The most common non-ocular adverse reaction is headache.

If you experience severe eye pain, decreased or blurred vision, significant redness or swelling of the eye, abnormal discharge, or any other signs of hypersensitivity reactions, discontinue the medication and seek medical attention immediately.

9. DOSAGE AND DIRECTION


Apply approximately a 1.3 cm (½ inch) ribbon of ointment into the conjunctival sac of the affected eye(s). Treatment is usually administered four times daily, starting 24 hours after ocular surgery, and continued for the first 2 weeks post-operatively, or as directed by the physician.

Direction

Wash your hands thoroughly with soap and water. Remove the tube cap. Tilt your head slightly backward. Gently pull down the lower eyelid. Carefully apply the prescribed amount of ointment into the conjunctival sac. Close your eye gently for 1–2 minutes. Replace the cap after use.

If other ophthalmic medications are

used, administer the ointment last.



10. STORAGE

- Store below 30°C.
- Keep the tube tightly closed after each use.
- Discard any remaining ointment one month after first opening the tube.
- Keep out of reach of children.

PACKAGING

Loteprednol-Najo 0.5% Sterile Ophthalmic Ointment is supplied in 3.5 g aluminum tubes.

REFERENCE

- UpToDate® Drug Information: 2024.
- Lotemax® (Loteprednol Etabonate Ophthalmic Ointment) Prescribing Information, 2022.

Issue Date: 2026/08.



IRAN NAJO PHARMACEUTICAL COMPANY
www.irannajo.ir
info@irannajo.com
Tel: +9821-88738730 Fax: +9821-88740644