

کرم موضعی کلوتریزون®

کلوتریمازول / بتامتازون

هر ۱۰۰ گرم کرم موضعی کلوتریزون® حاوی:

۱ گرم کلوتریمازول
۰/۰۵ گرم بتامتازون (به صورت دی پروپیونات)

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

موارد مصرف:

این دارو در درمان بعضی از عفونت های قارچی پوستی کاربرد دارد.

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

در صورتی که پس از دوره درمان بهبودی حاصل نشد به پزشک مراجعه کنید.

* قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

• در صورت حساسیت قبلی در مصرف کلوتریمازول، ایمیدازول ها، بتامتازون و یا سایر کورتیکواستروئیدها و یا موارد دیگر از قبیل حساسیت به مواد محافظ .

• در صورت استفاده از هر نوع داروی دیگر.
• در صورت وجود بیماری های دیگر از قبیل دیابت، عفونتهای پوستی، درماتیت Diaper، هریس سیمپلکس، آبله مرغان، سایر عفونت های ویروسی پوست.

هشدارها:

• تجویز دارو باید توسط پزشک صورت گیرد و نباید طولانی تر از مدت تعیین شده برای

درمان استفاده گردد.

• این دارو جهت مصرف خارجی است و از تماس با چشم، دهان و یا مصرف واژینال باید خودداری شود.

• پوست ناحیه درمان با این دارو (حتی در ناحیه تناسلی) نباید بانداژ شود.

• بیمار تحت درمان با این دارو باید از تماس با منابع عفونت زا خودداری کند.

• بعد از استحمام نواحی درگیر را خشک نمایید.

• از پوشیدن جوراب های پشمی یا نایلونی پرهیز نمایید.

• کفش های با تهویه خوب و یا لباس های گشاد بپوشید.

• از پوشیدن لباس های تنگ در ناحیه درگیر خودداری نمایید.

• در صورت فراموش کردن هر وعده بلافاصله بعد از به یادآوردن دارو را مصرف کنید. توجه داشته باشید مقدار مصرف دارو در یک وعده را دو برابر ننمایید.

• هیچ داروی حاوی کورتیکواستروئید دیگر بدون مشورت با پزشک همزمان با این کرم موضعی استفاده نشود.

• در صورت تاری دید، کاهش بینایی و یا هر نوع اختلال بینایی دیگر، حتماً به پزشک مراجعه نمایید.

• در صورتی که دارو به مدت طولانی و مداوم مصرف شود، ممکن است در صورت قطع دارو عوارض ترک مصرف دارو نظیر قرمزی پوست در اطراف ناحیه تحت درمان، احساس سوزش

و یا سوزن سوزن شدن، خارش شدید، پوسته پوسته شدن پوست و ترشح از زخم های باز مشاهده شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این کرم موضعی در دوران بارداری و یا شیردهی بخصوص به مدت طولانی و یا در نواحی وسیع و یا مقادیر زیاد توصیه نمی شود مگر به تشخیص پزشک متخصص.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود.

احتمال بروز عوارض زیر وجود دارد: حساسیت زیاد، سوزش، کهیر، بی حسی، بثورات پوستی، عفونت ثانویه، ورم، آکنه، درماتیت تماسی، فولیکولیت، پرمویی در صورت و بدن، ریزش مو در سر، خط های ارغوانی مایل به قرمز روی صورت، پاهای، بدن یا کشاله ران، نازکی پوست.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار و روش مصرف معمولی این دارو به شرح زیر است:

لایه نازکی از کرم موضعی را روی موضع دو بار در روز، صبح و شب به آرامی ماساژ دهید. در درمان تینه‌آ کورپوریس (جوش قرمز رنگ حلقه ای در بدن) یا تینه‌آ کروریس (جوش قرمز رنگ حلقه ای در کشاله ران)، این کرم موضعی روزی ۲ بار و به مدت دو هفته

استفاده شود. در درمان تینه‌آ پدیس (عفونت پای ورزشکاران)، این کرم موضعی به مدت ۴ هفته روزی ۲ بار مصرف شود.

در صورت عدم علائم بهبودی پس از یک هفته در تینه‌آ کورپوریس یا تینه‌آ کروریس و ۲ هفته در تینه‌آ پدیس به پزشک مراجعه نمایید (قرمزی و احساس تحریک پوست طی مدت ۳ تا ۵ روز باید بهبود یابد).

دوره درمان را کامل نمایید و بیش از تجویز پزشک مصرف ننمایید.

مقدار مصرف در اطفال زیر ۱۲ سال طبق نظر پزشک معالج می باشد.

موارد منع مصرف دارو:

در بیماری که به کلوتریمازول، بتامتازون دی پروپیونات یا کورتیکواستروئیدهای دیگر و ایمیدازول ها حساسیت دارند منع مصرف دارد.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

هر جعبه محتوی یک تیوب ۳۰ گرمی کرم موضعی کلوتریزون® به همراه راهنمای مصرف بیمار می باشد.



تهیه شده در لابراتوارهای داروسازی - پهلوانی - آرایش ایران نajo
تهران - ایران
www.irannajo.ir
info@irannajo.com
تلفن: +۹۸۲۱-۸۷۴۳۳۶۴ | فکس: +۹۸۲۱-۸۷۴۰۶۴۴

Topical Cream

Clotrison®

Clotrimazole/Betamethasone

Each 100g of Clotrison® Topical cream contains:

Clotrimazole 1g

Betamethasone (as dipropionate) 0.05g

CATEGORY:

Clotrison® topical cream contains combinations of Clotrimazole, a synthetic antifungal agent, and Betamethasone dipropionate, a synthetic corticosteroid, for dermatologic use.

MECHANISM OF ACTION:

Clotrimazole is an imidazole antifungal agent. Imidazoles inhibit 14- α -demethylation of lanosterol in fungi by binding to one of the cytochrome P-450 enzymes. This leads to the accumulation of 14- α methylsterols and reduced concentrations of ergosterol, a sterol essential for a normal fungal cytoplasmic membrane. The methylsterols may affect the electron transport system, thereby inhibiting growth of fungi. Betamethasone dipropionate, a corticosteroid, has been shown to have topical (dermatologic) and systemic pharmacologic and metabolic effects characteristic of this class of drugs.

INDICATIONS:

Treatment of symptomatic inflammatory tinea pedis, tinea cruris, and tinea corporis due to Epidermophyton floccosum,

Trichophyton mentagrophytes, and Trichophyton rubrum.

PRECAUTION TO CONSIDER:

Pregnancy: Pregnancy category C.

Nursing Mothers: May cause systemic effects, such as growth suppression, in infants. The use of Clotrison® topical cream in the treatment of diaper dermatitis is not recommended.

Pediatric: Because of higher ratio of skin surface area to body mass, pediatric patients under the age of 12 years are at a higher risk with Clotrison® topical cream. They are at increased risk of developing cushing,s syndrome while on treatment and adrenal insufficiency after withdrawal of treatment.

Geriatric: Caution should be exercised with the use of these corticosteroid containing topical products on thinning skin.

Special warning:

Visual disturbance may be reported with systemic and topical corticosteroid use. If a patient presents with symptoms such as blurred vision or other visual disturbances, the patient should be considered for referral to an ophthalmologist for evaluation of possible causes which may include cataract, glaucoma or rare diseases such as Central serous chorioretinopathy (CSCR) which have been reported after use of systemic and topical corticosteroids. Long term use of topical steroids can result in the development of rebound flares after

stopping treatment (topical steroid withdrawal syndrome). A severe form of rebound flare can develop which takes the form of a dermatitis with intense redness, stinging and burning that can spread beyond the initial treatment area. It is more likely to occur when delicate skin sites such as the face and flexures are treated. Should there be a reoccurrence of the condition within days to weeks after successful treatment a withdrawal reaction should be suspected. Reapplication should be with caution and specialist advise is recommended in these cases or other treatment options should be considered. This can be prevented by slow reduction of the treatment, for instance continue treatment on an intermittent basis before discontinuing treatment.

ADVERSE REACTIONS:

Signs of potential side effects, especially hypersensitivity; stinging; urticaria; paresthesia; rash; secondary infection; swelling; and long term effects, including acne or oily skin; allergic contact dermatitis; folliculitis; hypopigmentation; increased hair growth on face and body; increased hair loss on scalp; perioral dermatitis; reddish purple lines on arms, face, legs, trunk, or groin; skin atrophy; and skin maceration, blurred vision.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Gently massage sufficient Clotrison® topical cream into the affected skin areas twice a day, in the morning and evening. Clotrison®

topical cream should not be used longer than 2 weeks in the treatment of tinea corporis or tinea cruris. If a patient with tinea corporis or tinea cruris shows no clinical improvement after 1 week of treatment with Clotrison® topical cream, the diagnosis should be reviewed. Clotrison® topical cream should not be used longer than 4 weeks in the treatment of tinea pedis. Clotrison® topical cream should not be used with occlusive dressings.

Safety and efficacy of Clotrison® topical cream have not been established in children up to 12 years of age.

CONTRAINDICATIONS:

Clotrison® topical cream is contraindicated in patients who are sensitive to Clotrimazole, Betamethasone dipropionate, other corticosteroids or imidazoles, or to any ingredient in these preparations. Other condition such as herpes simplex, tubercular infections of skin, varicella, vaccinia or other viral infections of skin.

HOW SUPPLIED:

Each package of Clotrison® topical cream contains 1 tube of 30 g.

STORAGE:

Store below 30°C. Protect from freezing.



Iran Najo

IRAN NAJO PHARMACEUTICAL COMPANY
www.irannajo.ir
info@irannajo.com
Tel: +9821-88747363 Fax: +9821-88740644