

شیاف گلیسرین - ناژو ۲ گلیسرین

هر شیاف گلیسرین - ناژو ۲ حاوی ۱/۴ گرم گلیسرین می باشد.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

موارد مصرف

ملین محرک برای درمان کوتاه مدت یبوست و تخلیه روده‌ها

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

- اگر به این دارو یا هر جزء آن، حساسیت دارید. اگر هر یک از مشکلات زیر را دارید: انسداد روده درد شکمی خونریزی مقعدی استفراغ

تغییر در عادات دفع که بیش از ۲ هفته طول کشیده باشد.

• اگر باردار هستید، قصد بارداری دارید یا در حال شیردهی هستید.

• مصرف قبلی یک داروی مسهل بیش از ۱ هفته • تمام داروهای مصرفی خود (نسخه‌ای، بدون نسخه، گیاهی، ویتامین‌ها) و بیماری‌های خود را به پزشک و داروساز اطلاع دهید.

• بدون مشورت با پزشک، هیچ دارویی را شروع، قطع یا تغییر دوز ندهید.

• اگر دیابت دارید، قبل از استفاده از شیاف گلیسرین باید با پزشک خود مشورت کنید زیرا ممکن است با سطح قند خون شما تداخل داشته باشد.

هشدارها

• قبل از مصرف مسهل‌ها مهم است که اطمینان

حاصل شود بیمار دارای یبوست است و اینکه یبوست وی ثانویه به مشکل تشخیص داده نشده‌ای نباشد. یک تعریف کاربردی یبوست عبور مدفوع سفت به صورتی که در الگوی همیشگی دفعی بیمار کمتر شایع است، می باشد. فهم اشتباه درباره عادات روده ای می تواند منجر به مصرف بی رویه مسهل‌ها شود.

• بیش از ۱ هفته از این دارو استفاده نکنید مگر اینکه پزشک دستور داده باشد.

• اگر خونریزی مقعدی داشتید یا بعد از مصرف دارو اجابت مزاج نداشتید، به پزشک مراجعه کنید.

• اگر این دارو به اشتباه خورده شد، به پزشک مراجعه کنید.

• مصرف زیاد مسهل‌های محرک می تواند موجب اسهال و متعاقبا هایپوکالمی شود بنابراین استفاده بلند مدت این داروها تنها محدود به موارد خاص می شود.

• شیاف گلیسرین فقط برای مصرف مقعدی است.

• در صورت نرم شدن فرآورده آن را قبل از باز شدن در یخچال گذاشته یا دقایقی زیر جریان آب سرد نگه دارید.

• مسهل‌ها باید تحت نظر متخصصین کادر درمان در درمان یبوست اطفال تجویز شوند، در کودکان استفاده مکرر از ملین‌ها می‌تواند باعث وابستگی روده‌ای شود و باید اجتناب شود.

بارداری و شیردهی

از مصرف شیاف گلیسرول در سه ماه اول بارداری باید اجتناب شود. در صورت تجویز پزشک در سه ماهه دوم و سوم بارداری و دوران شیردهی قابل مصرف می باشد.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود. اگر چه همه‌ی این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از اثرات جانبی زیر بلافاصله به پزشک اطلاع دهید.

• **عوارضی که نیازمند تماس فوری با پزشک می باشند:**

• علائم واکنش آلرژیک شدید مانند: راش، کهیر، خارش، قرمزی یا تورم پوست، تاول یا پوسته‌ریزی (با یا

بدون تب)، خس‌خس سینه، مشکل در تنفس، بلع یا صحبت کردن، گرفتگی غیرعادی صدا، تورم دهان، صورت، لب‌ها، زبان یا گلو.

• درد شدید شکمی

• خونریزی از مقعد یا درد مقعدی

• **عوارضی که در صورت ادامه دار شدن نیازمند پیگیری و توجهات پزشکی می باشند:**

• کرامپ یا دل پیچه شکمی

• نفخ

• اسهال

• احساس سوزش در مقعد

• تحریک مقعد

• احساس نیاز مداوم به دفع

• **مقدار و نحوه مصرف**

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار و روش مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

کودکان ۱-۱۱ سال: ۱ شیاف گلیسرین - ناژو ۲ (۱/۴ گرم) در صورت لزوم

کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۲ شیاف گلیسرین - ناژو ۲ (۲/۸ گرم) در صورت لزوم

روش مصرف

• قبل از باز کردن پوشش شیاف، دست‌های خود را بشویید. در صورت نرم شدن فرآورده آن را قبل از باز شدن در یخچال گذاشته یا دقایقی زیر جریان آب سرد نگه دارید.

• برای باز کردن پوشش شیاف با انگشتان شست هر دو دست، پوشش دو طرف را از قسمت نوک شیاف گرفته و به سمت مخالف بکشید و سپس پوشش را از شیاف جدا نمایید. برای استعمال راحت تر داخل مقعد، بایستی سر شیاف را قبل از مصرف با آب مرطوب نمایید.

• به پهلوی چپ بخوابید و زانوی خود را به سمت قفسه سینه خم کنید.

• با استفاده از انگشت اشاره یا انگشت میانه خود، شیاف را به داخل مقعد فشار دهید. دقت نمایید شیاف را از سمت سر آن وارد مقعد نمایید.

• انتهای شیاف را به خوبی داخل مقعد فشار دهید. • پاهای خود را دراز کرده، تا شیاف به راحتی در محل مورد نظر قرار بگیرد.

• در صورت امکان، شیاف را حداقل به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در محل خود نگه دارید. اگر احساس کردید که شیاف می‌خواهد خارج شود، احتمالاً به اندازه کافی داخل مقعد قرار نگرفته است.

• ممکن است بلافاصله احساس نیاز به دفع داشته باشید، اما توجه داشته باشید که شیاف حداقل ۱۵ دقیقه طول می‌کشد تا اثر کند. بنابراین سعی کنید این حس را نادیده بگیرید.

شرایط نگهداری دارو

• دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید. • دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

• داروهای منقضی شده را به درستی دفع کنید؛ برنامه‌های جمع‌آوری دارو را از داروساز بپرسید. • دارو را از یخ زدگی محافظت نمایید.

• نرم بودن شیاف به دلیل ژلاتینی بودن پایه ی آن است و با نگهداری محصول در یخچال به مدت حداقل ۱ ساعت، محصول بدون کاهش اثر بخشی مجدداً به فرم مناسب مصرف باز خواهد گشت.

بسته بندی

• هر جعبه محتوی ۱۰ عدد شیاف داخل مقعدی گلیسرین - ناژو ۲ می‌باشد.



ایران ناژو

تهیه شده در لابراتوارهای شرکت داروسازی بهداشتی آرایشی

ایران ناژو تهران - ایران

www.irannajo.ir

info@irannajo.com

تلفن انتقادات و پیشنهادات: ۰۲۱-۸۸۷۳۸۷۳-۹۸۲۱

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۰۶۴۴-۹۸۲۱

Glycerin –Najo 2 suppository

Glycerin

Each suppository Glycerin-Najo2 contains: glycerin 1.4 g

CATEGORY

Laxative stimulant

MECHANISM OF ACTION

Stimulate the myenteric plexus and the auerbach plexus, increasing intestinal secretions and motility. They also decrease the absorption of water from the lumen of the bowel.

INDICATIONS

For short term treatment of constipation and for emptying the bowels.

PRECAUTIONS TO CONSIDER

Before prescribing laxatives, it is important to be sure that the patient is constipated and that the constipation is not secondary to an underlying undiagnosed complaint.

A useful definition of constipation is the passage of hard stools less frequently than the patients own normal pattern and this can be explained to the patient. Misconceptions about bowel habits have led to excessive laxative use.

Stimulant laxatives increase intestinal motility and often cause abdominal cramp; they should be avoided in intestinal obstruction. Excessive use of stimulant laxatives can cause diarrhea and related effects such as hypokalaemia; however, prolonged use may be justifiable in some circumstances.

Appropriate use: For rectal use only. Discontinue use and consult a health

care provider if rectal bleeding occurs or if no bowel movement is produced after use; may indicate serious condition.

Self-medication (OTC use): Consult a health care provider prior to use if stomach pain, nausea, vomiting, or a sudden change in bowel movements lasting >2 weeks occurs, or if you have already used a laxative >1 week. Use may cause stomach discomfort, faintness, rectal burning, and mild cramps. Discontinue use and consult a health care provider if use >1 week is needed.

Frequent or prolonged use of laxatives may result in dependence.

If you are diabetic you should speak to your doctor before using Glycerol suppositories as they may interfere with levels of sugar in your body.

Pediatrics:

Frequent use of laxatives may lead to bowel dependence and should be avoided.

Use suppository with caution in patients with abdominal pain, nausea, or vomiting; physician should be consulted prior to use. In children, if bowel

movement does not occur within 1 hour of use or rectal bleeding occurs, consult a physician.

Pregnancy:

Glycerol Suppositories should be avoided in the first three months of pregnancy. It may be used during the second and third trimesters of pregnancy if prescribed by a physician.

Breastfeeding

Glycerin suppositories may be used during breastfeeding if prescribed by a physician.

INTERACTIONS

Dichlorphenamide: Laxatives may enhance the hypokalemic effect of Dichlorphenamide. Risk C: Monitor therapy.

SIDE EFFECTS

Those indicating need for medical attention

Signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin with or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat.

Severe stomach pain.

Bleeding from rectum or rectal pain

Those indicating need for medical attention only if they continue or are bothersome

Upset stomach
Stomach cramps
Gas
Diarrhea
Burning
Rectal irritation

DOSAGE AND DIRECTION

• Child 1-11 years: 1 Glycerin-Najo 2 suppository (1.4 g glycerin) as required.

• Child 12 years and above: 2 Glycerin-Najo 2 suppository (2.8 g glycerin) as required.

STORAGE

Store below 30°C. Protect from light and moisture and protect from

freezing.

Keep the medication out of reach of children.

Softening of the suppository is due to gelatine base of the product and it will return to its appropriate form without reducing effectiveness by storing the product in refrigerator.

PACKAGING

Each package of Glycerine – Najo 2 contains 10 rectal suppositories.

REFERENCE

WWW.Medicines.Org.uk
British National Formulary,2016.
Issue date: 02.2026



Iran Najo

IRAN NAJO PHARMACEUTICAL COMPANY

www.irannajo.ir

info@irannajo.com

Tel: +9821-88738730 Fax: +9821-88740644