

لوسیون موضعی کلوتریزون®

کلوتریمازول / بتامتازون

هر ۱۰۰ گرم لوسیون موضعی کلوتریزون® حاوی:

۱ گرم کلوتریمازول

۰/۰۵ گرم بتامتازون (به صورت دی پروپیونات)

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمائید.

موارد مصرف:

این دارو در درمان بعضی از عفونت های قارچی پوستی کاربرد دارد.

راهنمایی های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

در صورتی که پس از دوره درمان بهبودی حاصل نشد به پزشک مراجعه کنید.

* قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمائید:

- در صورت حساسیت قبلی در مصرف کلوتریمازول، ایمیدازول ها، بتامتازون و یا سایر کورتیکواستروئیدها و یا موارد دیگر از قبیل حساسیت به مواد محافظ.
- در صورت استفاده از هر نوع داروی دیگر.
- در صورت وجود بیماری های دیگر از قبیل دیابت، عفونت های پوستی، درماتیت Diaper، هرپس سیمپلکس آبله مرغان، سایر عفونت های ویروسی پوست.

هشدارها:

- تجویز دارو باید توسط پزشک صورت گیرد و نباید طولانی تر از مدت تعیین شده برای درمان استفاده گردد.
- این دارو جهت مصرف خارجی است و از تماس با چشم، دهان و یا مصرف واژینال باید خودداری شود.
- پوست ناحیه درمان با این دارو (حتی در ناحیه تناسلی) نباید بانداژ شود.
- بیمار تحت درمان با این دارو باید از تماس با منابع عفونت زا خودداری کند.
- بعد از استحمام نواحی درگیر را خشک نمائید.
- از پوشیدن جوراب های پشمی یا نایلونی پرهیز نمائید.
- کفش های با تهویه خوب و یا لباس های گشاد بپوشید.
- از پوشیدن لباس های تنگ در ناحیه درگیر خودداری نمائید.
- در صورت فراموش کردن هر وعده بلافاصله بعد از به یاد آوردن دارو را مصرف کنید. توجه داشته باشید مقدار مصرف دارو در یک وعده را دو برابر ننمائید.
- هیچ داروی حاوی کورتیکواستروئید دیگر بدون مشورت با پزشک همزمان با این لوسیون موضعی استفاده نشود.
- در صورت تاری دیده، کاهش بینایی و یا هر نوع اختلال بینایی دیگر، حتماً به پزشک مراجعه نمائید.
- در صورتی که دارو به مدت طولانی و مداوم مصرف شود، ممکن است در صورت قطع دارو عوارض ترک مصرف دارو نظیر قرمزی پوست در اطراف ناحیه تحت درمان، احساس سوزش و یا سوزن سوزن شدن، خارش شدید، پوسته پوسته شدن پوست و ترشح از زخم های باز مشاهده شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این لوسیون موضعی در دوران بارداری و یا شیردهی بخصوص به مدت طولانی و یا در نواحی وسیع و یا مقادیر زیاد توصیه نمی شود مگر به تشخیص پزشک متخصص.

عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود.

احتمال بروز عوارض زیر وجود دارد:

حساسیت زیاد، سوزش، کهیر، بی حسی، بثورات پوستی، عفونت ثانویه، ورم، آکنه، درماتیت تماسی، فولیکولیت، پرمویی در صورت و بدن، ریزش مو در سر، خط های ارغوانی مایل به قرمز روی صورت، پاهای، بدن یا کشاله ران، نازکی پوست.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار و روش مصرف معمول این دارو به شرح زیر است: قبل از مصرف، ناحیه درگیر را با آب و صابون شسته و کاملاً خشک نمائید. لایه نازکی از لوسیون را روی موضع دو بار در روز، صبح و شب به آرامی ماساژ دهید. در درمان تینه آ کورپوریس (جوش قرمز رنگ حلقه ای در بدن) یا تینه آ کروریس (جوش قرمز رنگ حلقه ای در کشاله ران)، این لوسیون روزی ۲ بار و به مدت دو هفته استفاده شود. در درمان تینه آ پدیس (عفونت پای ورزشکاران)، این لوسیون به مدت ۴ هفته روزی ۲ بار مصرف شود. در صورت عدم علائم بهبودی پس از یک هفته در

تینه آ کورپوریس یا تینه آ کروریس و ۲ هفته در تینه آ پدیس به پزشک مراجعه نمائید (قرمزی و احساس تحریک پوست طی مدت ۳ تا ۵ روز باید بهبود یابد).

دوره درمان را کامل نمائید و بیش از تجویز پزشک مصرف ننمائید.

مقدار مصرف در اطفال زیر ۱۲ سال طبق نظر پزشک معالج می باشد.

موارد منع مصرف دارو:

در بیماری که به کلوتریمازول، بتامتازون دی پروپیونات یا کورتیکواستروئیدهای دیگر و ایمیدازول ها حساسیت دارند منع مصرف دارد.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

بسته بندی:

هر جعبه محتوی یک بطری ۳۰ میلی لیتری لوسیون موضعی کلوتریزون® به همراه راهنمای مصرف بیمار می باشد.



تهیه شده در لابراتوارهای داروسازی - بهداشتی - آرایشی ایران نajo
تهران - ایران
www.irannajo.ir
info@irannajo.com
تلفن: +۹۸۲۱-۸۸۷۳۶۳۰ فکس: +۹۸۲۱-۸۸۷۴۰۶۴۴

Topical Lotion

Clotrison®

Clotrimazole/Betamethasone

Each 100 ml of Clotrison® Topical Lotion contains:

Clotrimazole 1g
Betamethasone (as dipropionate) 0.05g

CATEGORY:

Clotrison® topical Lotion contains combinations of Clotrimazole, a synthetic antifungal agent, and Betamethasone dipropionate, a synthetic corticosteroid, for dermatologic use.

MECHANISM OF ACTION:

Clotrimazole is an imidazole antifungal agent. Imidazoles inhibit 14- α -demethylation of lanosterol in fungi by binding to one of the cytochrome P-450 enzymes. This leads to the accumulation of 14- α methylsterols and reduced concentrations of ergosterol, a sterol essential for a normal fungal cytoplasmic membrane. The methylsterols may affect the electro transport system, thereby inhibiting growth of fungi. Betamethasone dipropionate, a corticosteroid, has been shown to have topical (dermatologic) and systemic pharmacologic and metabolic effects characteristic of this class of drugs.

INDICATIONS:

Treatment of symptomatic inflammatory tinea pedis, tinea cruris, and tinea corporis due to Epidermophyton floccosum, Trichophyton mentagrophytes, and Trichophyton rubrum.

PRECAUTION TO CONSIDER:

Pregnancy: Pregnancy category C.

Nursing Mothers: May cause systemic effects, such as growth suppression, in infants. The use of Clotrison® topical lotion in the treatment of diaper dermatitis is not recommended.

Pediatric: Because of higher ratio of skin surface area to body mass, pediatric patients under the age of 12 years are at a higher risk with Clotrison® topical lotion. They are at increased risk of developing cushing's syndrome while on treatment and adrenal insufficiency after withdrawal of treatment.

Geriatric: Caution should be exercised with the use of these corticosteroid containing topical products on thinning skin.

Special warning:

Visual disturbance may be reported with systemic and topical corticosteroid use. If a patient presents with symptoms such as blurred vision or other visual disturbances, the patient should be considered for referral to an ophthalmologist for evaluation of possible causes which may include cataract, glaucoma or rare diseases such as Central serous chorioretinopathy (CSCR) which have been reported after use of systemic and topical corticosteroids.

Long term use of topical steroids can result in the development of rebound flares after stopping treatment (topical steroid withdrawal syndrome). A severe form of rebound flare can develop which takes the form of a dermatitis with intense redness, stinging and burning that

can spread beyond the initial treatment area. It is more likely to occur when delicate skin sites such as the face and flexures are treated. Should there be a reoccurrence of the condition within days to weeks after successful treatment a withdrawal reaction should be suspected. Reapplication should be with caution and specialist advise is recommended in these cases or other treatment options should be considered.

This can be prevented by slow reduction of the treatment, for instance continue treatment on an intermittent basis before discontinuing treatment.

ADVERSE REACTIONS:

Signs of potential side effects, especially hypersensitivity; stinging; urticaria; paresthesia; rash; secondary infection; swelling; and long term effects, including acne or oily skin; allergic contact dermatitis; folliculitis; hypopigmentation; increased hair growth on face and body; increased hair loss on scalp; perioral dermatitis; reddish purple lines on arms, face, legs, trunk, or groin; skin atrophy; and skin maceration, blurred vision.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Before applying, washing affected area with soap and water, and drying thoroughly. Gently massage sufficient Clotrison® topical lotion into the affected skin areas twice a day, in the morning and evening. Clotrison® topical lotion should not be used longer than 2 weeks in the treatment of tinea corporis or tinea cruris. If a

patient with tinea corporis or tinea cruris shows no clinical improvement after 1 week of treatment with Clotrison® topical lotion, the diagnosis should be reviewed. Clotrison® topical lotion should not be used longer than 4 weeks in the treatment of tinea pedis. Clotrison® topical lotion should not be used with occlusive dressings. Safety and efficacy of Clotrison® topical lotion have not been established in children up to 12 years of age.

CONTRAINDICATIONS:

Clotrison® topical lotion is contraindicated in patients who are sensitive to Clotrimazole, Betamethasone dipropionate, other corticosteroids or imidazoles, or to any ingredient in these preparations. Other condition such as herpes simplex, tubercular infections of skin, varicella, vaccinia or other viral infections of skin.

HOW SUPPLIED:

Each package of Clotrison® topical lotion contains 1 bottle of 30 ml.

STORAGE:

Store below 30°C. Protect from freezing.

Revised date: 06.2024



Iran Najo

IRAN NAJO PHARMACEUTICAL COMPANY
www.irannajo.ir
info@irannajo.com

Tel: +9821-88747363 Fax: +9821-88740644