

شیاف

آنتی هموروئید - نازو

آنتی هموروئید

هر شیاف حاوی ۴۰۰ میلی گرم زینک اکسید، ۶۰ میلی گرم لیدوکائین، ۵۰ میلی گرم آلومینیوم ساب استات و ۵ میلی گرم هیدروکورتیزون استات است.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری ننمائید.

موارد مصرف

درد، خارش و التهاب ناشی از هموروئید
اگرمای حاد یا مزمن مقعد
شقاق و التهاب در مقعد

راهنمایی‌های عمومی برای مصرف صحیح دارو

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمائید:

* در صورت حساسیت قبلی در مصرف هیدروکورتیزون استات و یا سایر کورتیکواستروئیدها، زینک اکسید، لیدوکائین و آلومینیوم ساب استات

* در صورت مصرف همزمان داروهای دیگر از قبیل کورتیکواستروئیدها

* در صورت بارداری و شیردهی

* در صورت ابتلا به مشکلات قلبی - عروقی مانند آریتمی قلبی

هشدارها

• دوز بیش از حد لیدوکائین یا فواصل کوتاه بین دوزها ممکن است منجر به سطح بالای لیدوکائین در پلاسما و عوارض جانبی جدی شود.

• قبل از استفاده، احتمال بدخیمی باید رد شود.

• در صورت مصرف شیاف آنتی هموروئید پیش از انجام اقدامات دندانپزشکی یا سایر اقداماتی که نیاز به بی حسی دارند، حتما دندانپزشک و یا پزشک را مطلع نمایید.

• مصرف دراز مدت آن باعث آتروفی پوست ناحیه مورد مصرف می‌شود.

• در صورت آلوده بودن موضع مورد مصرف به قارچ، از داروی ضد قارچ نیز استفاده شود.

• قبل و بعد از استفاده دست‌ها شسته شود.

• مصرف همزمان شیاف آنتی هموروئید یا داروهای حاوی کورتیکواستروئید موجب افزایش عوارض جانبی کورتیکواستروئیدها می‌شود.

• در صورت بروز سوزش یا خونریزی مقعد، درمان باید قطع شود.

• هرگونه آلرژی را بررسی و به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

• در اطفال کارایی دارو مشخص نیست.

• در طی دوره درمان، مراقبت‌های بهداشتی از

قبیل شستشوی موضع و خشک نمودن با پارچه کتانی توصیه می‌شود.

بارداری و شیردهی

بارداری: مصرف این دارو در دوران بارداری مطالعه ای نشده است اما به جهت احتمال بروز عوارض در جنین، مصرف آن در زنان باردار تنها تحت نظر پزشک توصیه می‌شود.

شیردهی: در شیر مادر نیز ترشح می‌شود. از این رو پیشنهاد می‌شود تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

واکنشهای پوستی (واکنش موضعی، خونریزی، سوزش، خارش، خشکی).

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند ولی مقدار و روش مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

هر روز ۲ عدد (صبح و شب) به مدت ۵ روز استعمال شود.

حداکثر مدت مصرف دارو ۱ تا ۲ هفته است در صورت عدم بهبودی به پزشک مراجعه نمایید.

در صورت فراموش کردن هر وعده بلافاصله بعد از به یاد آوردن دارو را مصرف کنید، توجه داشته

باشید مقدار دارو در یک وعده را دو برابر مصرف ننمائید.

روش مصرف

• برای حصول نتایج درمانی بهتر، قبل از مصرف شیاف اجابت مزاج انجام شود.

• قبل از باز کردن پوشش شیاف، دست‌های خود را بشویید. برای باز کردن پوشش شیاف با انگشتان شست هر دو دست، پوشش دو طرف را از قسمت نوک شیاف گرفته و به سمت مخالف بکشید و سپس پوشش را از شیاف جدا نمایید.

• به پهلو چپ بخوابید و زانوی بالایی را به سمت قفسه سینه خم کنید.

• با استفاده از انگشت اشاره یا انگشت میانه خود، شیاف را به داخل مقعد فشار دهید. دقت نمایید شیاف را از سمت سر آن وارد مقعد نمایید.

• انتهای شیاف را به خوبی داخل مقعد فشار دهید.

• پاهای خود را دراز کرده، تا شیاف به راحتی در محل مورد نظر قرار بگیرد.

• برای اثربخشی بیشتر، بهتر است ۱ تا ۳ ساعت پس از مصرف شیاف از اجابت مزاج خودداری نمایید.

موارد منع مصرف

- واریسلا
- عفونت‌های قارچی و شدید شامل هرپس سیمپلکس، سیفلیس و گنوره آ
- عفونت‌های ویروسی و سل در موضع مورد

درمان

• آتروفی پوست اطراف مقعد

• عفونت‌های موضعی درمان نشده با منشاء

باکتریایی، ویروسی، قارچی یا انگلی

• در صورت مصرف داروهای ضد آریتمی کلاس

III (مانند سوتالول یا آمیودارون)

شرایط نگهداری

- دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نماید.

- دارو را از یخ زدگی محافظت نمایید.

- دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

- توجه شود که دماهای بالای ۳۰ درجه سانتیگراد، سبب نرم شدن و تغییر شکل شیاف می‌گردد.

بسته بندی

هر جعبه محتوی ۱۰ عدد شیاف داخل مقعدی آنتی هموروئید - نازو می‌باشد.



ایران نازو

تهیه شده در لابراتوارهای شرکت داروسازی، بهداشتی، آرایشی

ایران نازو تهران - ایران

www.irannajo.ir

info@irannajo.com

تلفن انتقادات و پیشنهادات: ۰۲۱-۸۸۷۳۸۷۳-۹۸۲۱+

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۰۶۴۴-۹۸۲۱+

Antihemorrhoid–Najo SUPPOSITORY

Antihemorrhoid

Each suppository contains: zinc oxide 400 mg + lidocaine 60 mg + aluminium subacetate 50 mg+ hydrocortison acetate 5 mg

CATEGORY

Antihemorrhoid.

MECHANISM OF ACTION

Lidocaine has analgesic effects and acts via reversible block of the impulses from the nerve fibres.

Hydrocortisone has anti-inflammatory properties.

Antihemorrhoid also contains aluminium isubacetate and zinc oxide, which have astringent and disinfectant properties.

INDICATIONS

Treatment of pain, itching and discomfort arising from irritated anorectal tissues eg, hemorrhoids, pruritus ani, proctitis, milder forms of anal fissures, postoperative pain relief.

PERCAUTIONS TO CONSIDER

Before prescribing, the patient should

be investigated to exclude a malign process.

Contact with eyes should be avoided. The hands should be washed after usage.

Prolonged use of large doses of hydrocortisone can result in systemic effects or local effects eg, skin atrophy. With recommended doses and treatment period that do not exceed 3 weeks, systemic effects of hydrocortisone are unlikely.

In the event of infections caused by viruses, bacteria, pathogenic fungi or parasites, local glucocorticoids must not be used without concomitant causal therapy.

In the event of irritation or rectal bleeding, the treatment should be discontinued and the patient investigated.

Local irritation can sometimes be due to hypersensitivity to lidocaine or hydrocortisone and in such cases, the treatment should be discontinued.

Overdosage of lidocaine or short intervals between the doses can result in high plasma levels of lidocaine and serious adverse events.

The patients must be instructed to follow the recommended posology

care.

Patients treatment Class III antiarrhythmic drugs (eg, amiodarone) should be closely observed and electrocardiogram (ECG) monitoring should be considered, as the cardiac effects of lidocaine and Class III antiarrhythmic drugs can be additive.

The active substance lidocaine is probably porphyrinogenic and should be prescribed to patients with acute porphyria when no safer alternative is available. Precautions are motivated in all patients with porphyria.

INTERACTIONS

Should be used with caution together with dental injection anaesthesia, other local anaesthetics or agents structurally related to local anaesthetics of amide type eg, antiarrhythmic drugs (eg, mexilentine), as the toxic effects of these drugs are additive.

Patients treated with class III antiarrhythmic drugs (eg, amiodarone) should be closely observed and ECG monitoring should be considered, as the cardiac effects of lidocaine and class III antiarrhythmic drugs can be additive.

Drugs that inhibit the metabolism of lidocaine (eg, cimetidine or β -block-

ers) may cause potentially toxic plasma concentrations when lidocaine is given in repeated high doses over a long time period.

Such interactions are of no clinical importance following short-term treatment with lidocaine at recommended doses.

CONTRAINDICATIONS

Tubercular, fungal and most viral lesions including herpes simplex, vaccinia and varicella, history of sensitivity to any of the constituents, syphilis and gonorrhoea.

SIDE EFFECTS

Skin and subcutaneous: Contact dermatitis.

Immune system disorders: Allergic reactions In the most severe. The risk of adverse events increases with longer treatment periods. Patients may occasionally experience transient burning on application, especially if the anoderm is not intact.

DOSAGE AND DIRECTION

In adults: Remove plastics cover and insert one suppository into the anus twice a day (morning and evening) for 5 days. Usage in children is not recommended.

STORAGE

- Store at controlled room temperature below 30°C and must be protected from freezing.

- Keep out of reach of children.

- Care should be taken to ensure that the suppository is not heated above 30 °C since this may cause softening and deformation.

PACKAGING

Each package of antihemorrhoid-Najo contains 10 rectal suppositories.

REFERENCE

www.medicines.org.uk

www.bnf.org

Issue.Date: 04.2026



Iran Najo

IRAN NAJO PHARMACEUTICAL COMPANY

www.irannajo.ir

info@irannajo.com

Tel: +9821-88738730 Fax: +9821-88740644