

قرص روکش دار خوراکی ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰ ایبوپروفن

هرعدد قرص روکش دار

ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰ حاوی:

ایبوپروفن ۴۰۰ میلی گرم

لطفاً قبل از مصرف دارو، این بروشور را با دقت مطالعه نمایید زیرا حاوی اطلاعات مهمی برای شما است.

• اگر سؤال دیگری دارید، از پزشک یا داروساز خود بپرسید.

• این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

• در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی، حتی مواردی که در این بروشور ذکر نشده‌اند، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

مطالب این بروشور

۱.ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰ چیست و چه کاربردی دارد؟

۲.قبل از مصرف ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰ چه نکاتی را باید بدانید؟

۳.چگونه باید داروی ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰ را مصرف کنید؟

۴.عوارض جانبی احتمالی

۵.نحوه نگهداری دارو

۶.محتویات بسته و سایر اطلاعات

۱–ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰ چیست و چه کاربردی دارد؟

قرص ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰، حاوی ماده‌ی فعال ایبوپروفن است. این دارو به گروهی از داروها به نام «ضد التهاب های غیر استروئیدی» تعلق دارد. این داروها با کاهش سطح پروستاگلاندین ها باعث کاهش التهاب و درد می‌گردند.

موارد مصرف:

- تسکین درد، کاهش تورم و تب
- تسکین دردهای دوران قاعدگی
- درمان آرتریت (التهاب مفاصل)

۲– قبل از مصرف ایبوپروفن –

ناژو ۴۰۰ چه نکاتی را باید بدانید؟

از مصرف دارو خودداری کنید اگر:

- اگر به ایبوپروفن یا داروهای دیگری از گروه ضدالتهاب های غیر استروئیدی مانند آسپرین، ناپروکسن، دیکلوفناک، ملوکسیکام و… حساسیت دارید.
- اگر باید عمل جراحی بای‌پس قلب انجام دهید.
- اگر به سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی حساسیت دارید.
- اگر دچار بیماری آسم هستید یا تاکنون در اثر مصرف داروهای حاوی سالیسیلات مانند آسپرین یا داروهای مشابه این دارو، دچار آسم شده‌اید.
- اگر دچار مشکلات کلیوی هستید.
- اگر اخیراً حمله قلبی داشته‌اید.
- اگر داروی دیگری از این دسته مثل آسپرین مصرف می‌کنید.
- اگر سیگار یا نوشیدنی‌های الکلی مصرف می‌کنید.
- اگر به فنیل کتونوری مبتلا هستید.
- اگر ۶۰ سال یا بیشتر دارید، زیرا ممکن است بیشتر در معرض بروز عوارض جانبی قرار داشته باشید.

• قبل یا حین مصرف فرآورده در صورت وجود هریک از موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

- اگر دچار بیماری‌های قلبی عروقی هستید، زیرا این دارو ممکن است خطر بروز مشکلات قلبی و عروقی مانند حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش دهد. این عوارض می‌توانند کشنده باشند. در صورت ابتلا به بیماری قلبی یا وجود عوامل خطر بیماری قلبی، این خطر ممکن است بیشتر باشد. با این‌حال، حتی در افرادی که بیماری قلبی یا عوامل خطر بیماری قلبی ندارند نیز ممکن است این خطر افزایش یابد. این خطر ممکن است در هفته‌های اول مصرف دارو ایجاد شود و با مصرف دوزهای بالاتر یا مصرف طولانی‌مدت دارو افزایش یابد.
- اگر دچار بیماری‌های گوارشی مثل زخم معده هستید، زیرا این دارو ممکن است خطر بروز مشکلات شدید و گاهی کشنده معده یا روده، مانند زخم یا خونریزی معده یا روده را افزایش دهد. این خطر در افراد مسن و افرادی که سابقه زخم یا خونریزی معده یا روده داشته‌اند، بیشتر است. این مشکلات ممکن است بدون بروز علائم هشداردهنده ایجاد شوند.
- اگر قصد بارداری دارید، زیرا داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی ممکن است بر تخمک‌گذاری تأثیر بگذارند و در نتیجه

دفع ادرار، تغییر در مقدار ادرار، وجود خون در ادرار یا افزایش قابل‌توجه وزن •علائم افزایش سطح پتاسیم خون مانند ضربان قلب غیرطبیعی، گیجی، ضعف، احساس سبکی سر یا سرگیجه، احساس غش کردن، بی‌حسی یا گزگز، یا تنگی نفس

- علائم افزایش فشار خون مانند سردرد یا سرگیجه شدید، غش کردن یا تغییر در بینایی
- تنگی نفس، افزایش قابل‌توجه وزن یا تورم دست‌ها یا پاها
- درد یا احساس فشار در قفسه سینه یا ضربان سریع قلب
- ضعف یا بی‌حسی در یک طرف بدن، مشکل در صحبت کردن یا فکر کردن، اختلال در تعادل، افتادگی یک طرف صورت یا تاری دید
- احساس خستگی یا ضعف شدید
- وزوز گوش
- درد بسیار شدید کمر
- تغییر در بینایی

• ممکن است این دارو باعث بروز واکنش های شدید پوستی شود. این واکنش‌ها شامل سندرم استیونز–جانسون، نکرولیز اپیدرمال سمی و سایر واکنش‌های شدید پوستی هستند. در برخی موارد ممکن است اندام‌های داخلی بدن نیز درگیر شوند. این واکنش‌ها می‌توانند کشنده باشند. در صورت بروز علائمی مانند قرمزی، تورم، تاول‌زدگی یا پوسته‌ریزی پوست؛ قرمزی یا تحریک چشم‌ها؛ زخم در دهان، گلو، بینی، چشم‌ها، ناحیه تناسلی یا هر قسمت دیگری از پوست؛ تب؛ لرز؛ بدن‌درد؛ تنگی نفس یا تورم غدد لنفاوی، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

• این دارو ممکن است خطر بروز یک مشکل شدید مغزی به نام مننژیت آپتیک را افزایش دهد. در صورت بروز علائمی مانند سردرد، تب، لرز، تهوع یا استفراغ

شدید، سفتی گردن، بثورات پوستی، حساسیت چشم‌ها به نور، خواب‌آلودگی یا گیجی، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

- مصرف داروهایی مانند این دارو با بروز مشکلات کبدی همراه بوده است که در برخی موارد می‌تواند کشنده باشد. در صورت بروز علائم مشکلات کبدی مانند ادرار تیره، خستگی، کاهش اشتها، ناراحتی یا درد معده، مدفوع کمرنگ، استفراغ یا زرد شدن پوست یا چشم‌ها، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.
- تنگی نفس، افزایش قابل‌توجه وزن یا تورم دست‌ها یا پاها
- درد یا احساس فشار در قفسه سینه یا ضربان سریع قلب
- ضعف یا بی‌حسی در یک طرف بدن، مشکل در صحبت کردن یا فکر کردن، اختلال در تعادل، افتادگی یک طرف صورت یا تاری دید
- احساس خستگی یا ضعف شدید
- وزوز گوش
- درد بسیار شدید کمر
- تغییر در بینایی

• ممکن است این دارو باعث بروز واکنش های شدید پوستی شود. این واکنش‌ها شامل سندرم استیونز–جانسون، نکرولیز اپیدرمال سمی و سایر واکنش‌های شدید پوستی هستند. در برخی موارد ممکن است اندام‌های داخلی بدن نیز درگیر شوند. این واکنش‌ها می‌توانند کشنده باشند. در صورت بروز علائمی مانند قرمزی، تورم، تاول‌زدگی یا پوسته‌ریزی پوست؛ قرمزی یا تحریک چشم‌ها؛ زخم در دهان، گلو، بینی، چشم‌ها، ناحیه تناسلی یا هر قسمت دیگری از پوست؛ تب؛ لرز؛ بدن‌درد؛ تنگی نفس یا تورم غدد لنفاوی، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

• مصرف داروهایی مانند این دارو ممکن است باعث افزایش فشار خون شود. فشار خون خود را طبق توصیه پزشک به‌طور منظم بررسی کنید.

• ممکن است در هنگام مصرف این دارو خونریزی با سهولت بیشتری اتفاق بیفتد. مراقب باشید و از وارد شدن آسیب و جراحت جلوگیری کنید. از مسواک نرم و ریش تراش برقی استفاده کنید.

• ممکن است در هنگام مصرف این دارو خونریزی با سهولت بیشتری اتفاق بیفتد. مراقب باشید و از وارد شدن آسیب و جراحت جلوگیری کنید. از مسواک نرم و ریش تراش برقی استفاده کنید.

• ممکن است در هنگام مصرف این دارو خونریزی با سهولت بیشتری اتفاق بیفتد. مراقب باشید و از وارد شدن آسیب و جراحت جلوگیری کنید. از مسواک نرم و ریش تراش برقی استفاده کنید.

• ممکن است در هنگام مصرف این دارو خونریزی با سهولت بیشتری اتفاق بیفتد. مراقب باشید و از وارد شدن آسیب و جراحت جلوگیری کنید. از مسواک نرم و ریش تراش برقی استفاده کنید.

سایر داروها و ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰

• اگر در حال مصرف داروی دیگری هستید، اخیراً دارویی مصرف کرده‌اید یا ممکن است دارویی مصرف کنید، حتماً پزشک یا داروساز خود را در جریان بگذارید. این موضوع شامل داروهایی که بدون نسخه پزشک تهیه می‌کنید نیز می‌شود.

• اگر هر یک از داروهای زیر را مصرف می کنید، حتماً پزشک یا داروساز خود را مطلع کنید:

• مصرف داروهایی مانند این دارو با بروز مشکلات کبدی همراه بوده است که در برخی موارد می‌تواند کشنده باشد. در صورت بروز علائم مشکلات کبدی مانند ادرار تیره، خستگی، کاهش اشتها، ناراحتی یا درد معده، مدفوع کمرنگ، استفراغ یا زرد شدن پوست یا چشم‌ها، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.

مصرف طولانی‌مدت

• به تمام اعضای کادر درمان، از جمله پزشکان، پرستاران، داروسازان و دندانپزشکان، اطلاع دهید که این دارو را مصرف می‌کنید.

• اگر این دارو را به مدت طولانی مصرف می‌کنید، ممکن است لازم باشد طبق نظر پزشک، آزمایش‌های خون انجام دهید. • مصرف داروهایی مانند این دارو ممکن است باعث افزایش فشار خون شود. فشار خون خود را طبق توصیه پزشک به‌طور منظم بررسی کنید.

اگر در دوران شیردهی هستید، پزشک خود را مطلع کنید. لازم است درباره خطرات احتمالی مصرف این دارو برای نوزاد با پزشک مشورت کنید.

رانندگی و کار با ماشین‌آلات

مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمائید.

۳– چگونه باید داروی ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰ را مصرف کنید؟

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار و روش مصرف معمول این دارو به شرح زیر است: همیشه دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.

بزرگسالان

برای دردهای خفیف تا متوسط، تب،

قاعدگی دردناک:

۴۰۰–۲۰۰ میلی گرم هر ۶–۴ ساعت برحسب نیاز (حداکثر مقدار مجاز ۱۲۰۰ میلی گرم می‌باشد)

برای درمان بیماری های التهابی:

۸۰۰–۴۰۰ میلی گرم هر ۸–۶ ساعت (حداکثر مقدار مجاز ۳۲۰۰ میلی گرم می باشد)

برای درمان استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید:

۸۰۰–۴۰۰ میلی گرم هر ۸–۶ ساعت (حداکثر مقدار مجاز ۳۲۰۰ میلی گرم می باشد)

بیماران مبتلا به بیماری کلیوی

• میزان مصرف دارو در این بیماران باید تحت نظر پزشک تنظیم شود.

روش مصرف

این دارو را می‌توان همراه غذا یا بدون غذا مصرف کرد. اگر باعث ناراحتی معده می شود، آن را همراه غذا مصرف کنید.

دارو را همراه با یک لیوان پر آب مصرف کنید.

اگر بیشتر از مقدار تعیین شده داروی ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰ را مصرف کردید:

در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده، سریعاً به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید و بسته دارو را همراه داشته باشید.

اگر یک نوبت مصرف داروی ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰ را فراموش کردید:

اگر این دارو را به‌طور منظم مصرف می کنید، به محض اینکه به یاد آوردید، دوز فراموش‌شده را مصرف کنید. اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده است، دوز فراموش‌شده را مصرف نکنید و مصرف دارو را طبق برنامه معمول ادامه دهید.

همزمان یا دوز اضافی مصرف نکنید. در بسیاری از موارد، این دارو در صورت نیاز مصرف می‌شود.

بسیاری از موارد، این دارو در صورت نیاز مصرف می‌شود.

۴– عوارض جانبی احتمالی

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. اگر هر یک از عوارض زیر یا هر عارضه دیگری شما را آزار می‌دهد یا برطرف نمی‌شود، با پزشک خود تماس بگیرید یا به مراکز درمانی مراجعه کنید:

عوارض نادر

*اگرچه بروز این عوارض نادر است، در صورت بروز هر یک از علائم یا نشانه‌های زیر که ممکن است مربوط به یک عارضه جدی باشد، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید یا به مراکز درمانی مراجعه کنید:

• واکنش های آلرژیک، خونریزی، ایجاد کبودی بدون علت یا بزرگ‌تر شدن کبودی ها، خونریزی‌ای که متوقف نمی‌شود، مشکلات کلیوی، افزایش سطح پتاسیم خون، افزایش فشار خون، تنگی نفس، افزایش قابل‌توجه وزن یا تورم دست‌ها یا پاها، درد یا احساس فشار در قفسه سینه یا ضربان سریع قلب، ضعف یا بی‌حسی در یک طرف بدن، مشکل در صحبت کردن یا فکر کردن، اختلال در تعادل، افتادگی یک طرف صورت یا تاری دید، احساس خستگی یا ضعف شدید، وزوز گوش، درد بسیار شدید کمر، تغییر در بینایی، سندرم استیونز–جانسون، نکرولیز اپیدرمال سمی و سایر واکنش‌های شدید پوستی

سایر عوارض

یبوست، اسهال، درد معده، ناراحتی معده یا استفراغ، سوزش سر دل، نفخ، سرگیجه

۵– نحوه نگهداری دارو

• دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

۶– محتویات بسته و سایر اطلاعات

هر جعبه محتوی ۱۰ بلیستر ۱۰ عددی قرص روکش دار ایبوپروفن – ناژو ۴۰۰ می‌باشد.

منبع

UpToDate 2026

Medscape

تاریخ بازنگری ۱۴۰۵/۰۶



تهیه شده در لابراتوارهای شرکت داروسازی بهداشتی‌آرایشی ایران ناژو تهران – ایران

www.irannajo.ir
info@irannajo.com

تلفن انتقادات و پیشنهادات: ۰۸۷۲۸۷۳۰–۹۸۸۲۱
فکس: ۰۸۷۴۰۶۴۴–۹۸۸۲۱