

قرص انتریک کوتد راپیرازول–ناژو ۲۰

راپیرازول

هر عدد قرص انتریک کوتد راپیرازول–ناژو ۲۰ حاوی:

راپیرازول سدیم ۲۰ میلی گرم

لطفاً قبل از مصرف دارو، این بروشور را با دقت مطالعه نمایید زیرا حاوی اطلاعات مهمی برای شما است.

• اگر سؤال دیگری دارید، از پزشک یا داروساز خود بپرسید.

• این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

• در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی، حتی مواردی که در این بروشور ذکر نشده‌اند، به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

مطالب این بروشور

۱.راپیرازول–ناژو ۲۰ چیست و چه کاربردی دارد؟

۲. قبل از مصرف راپیرازول–ناژو ۲۰ چه نکاتی را باید بدانید؟

۳. نحوه مصرف راپیرازول–ناژو ۲۰

۴. عوارض جانبی احتمالی

۵. نحوه نگهداری دارو

۶. محتویات بسته و سایر اطلاعات

۱– راپیرازول–ناژو ۲۰ چیست و چه کاربردی دارد؟

راپیرازول–ناژو ۲۰ حاوی ماده مؤثره راپیرازول سدیم است که به گروهی از داروها به نام مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPI) تعلق دارد.

این دارو باعث کاهش ترشح اسید معده می‌گردد.

موارد مصرف:

• درمان بیماری رفلاکس معده به مری (GERD)

همراه یا بدون سوزش سر دل

• درمان زخم معده

• درمان زخم دوازدهه

• درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری همراه با آنتی

بیوتیک‌های مناسب

• پیشگیری از عود زخم ناشی از هلیکوباکتر پیلوری

• درمان سندرم زولینگر–الیسون که با ترشح بیش از حد اسید معده همراه است.

۲– قبل از مصرف راپیرازول–ناژو ۲۰ از مصرف دارو خودداری کنید اگر:

• به راپیرازول حساسیت دارید.

• در دوران شیردهی هستید.

هشدارها:

قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید اگر:

• به سایر مهارکننده‌های پمپ پروتون (شامل امپرازول، اس امپرازول، پنتوپرازول و لانسوپرازول) حساسیت دارید.

• سابقه بیماری کبدی دارید.

• مبتلا به تومور معده هستید.

• آتازاناویر مصرف می‌کنید.

• در معرض کمبود ویتامین B_{۱۲} هستید یا درمان طولانی‌مدت دریافت می‌کنید.

• سابقه واکنش پوستی ناشی از داروهای کاهش دهنده اسید معده دارید.

• قرار است آزمایش کرم‌گرانین A انجام دهید.

• سابقه التهاب کلیه مرتبط با مصرف این داروها داشته‌اید.

در صورت مشاهده علائم زیر فوراً به پزشک مراجعه نمایید

• بثورات پوستی به‌خصوص پس از قرار گرفتن در معرض نور خورشید

• درد مفاصل همراه با بثورات

• کاهش حجم ادرار یا وجود خون در ادرار

• اسهال شدید آبکی یا خونی همراه تب یا درد شکم

مصرف طولانی‌مدت

• مصرف مهارکننده‌های پمپ پروتون بیش از یک سال ممکن است خطر شکستگی استخوان های لگن، مچ دست و ستون فقرات را اندکی افزایش دهد. در صورت ابتلا به پوکی استخوان یا مصرف کورتیکواستروئیدها، پزشک خود را مطلع نمایید.

• مصرف این دارو بیشتر از ۳ ماه، ممکن است منجر به کاهش منیزیم خون و ظهور عوارضی نظیر گرفتگی عضلات، احساس خستگی، سرگیجه و افزایش ضربان قلب گردد. در صورت مشاهده این علایم بلافاصله با پزشک تماس بگیرید. کاهش میزان منیزیم خون ممکن است منجر به کاهش میزان پتاسیم یا کلسیم خون گردد. پزشک ممکن است آزمایش منیزیم خون درخواست نماید.

کودکان

مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی‌شود.

مصرف همزمان با سایر داروها در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر، پزشک خود را مطلع نمایید:

• کتوکونازول

• ایتراکونازول

• آتازاناویر

• متوترکسات با دوز بالا

• سایر داروهای تجویزی یا بدون نسخه

• فرآورده‌های گیاهی

راپیرازول ممکن است اثربخشی برخی از این داروها را تغییر دهد.

بارداری و شیردهی

در دوران بارداری، فقط با نظر پزشک مصرف شود.

در دوران شیردهی از مصرف این دارو خودداری نمایید.

رانندگی و کار با ماشین‌آلات

در صورت احساس خواب‌آلودگی از رانندگی یا کار با ماشین‌آلات خودداری نمایید.

سدیم

این فرآورده کمتر از ۲۳ میلی‌گرم سدیم در هر قرص دارد و عملاً فاقد سدیم محسوب می‌شود.

۳– نحوه مصرف راپیرازول–ناژو ۲۰

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار و روش مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

نکات مهم

• قرص را درست قبل از مصرف از بلیستر و یا بطری خارج نمایید.

• قرص را کامل همراه آب ببلعید.

• از خرد کردن، نصف کردن یا جویدن قرص خودداری نمایید.

• دارو ترجیحاً صبح ۱ ساعت قبل از صبحانه مصرف گردد.

دوزهای معمول در بزرگسالان

رفلاکس شدید

درمان نگهدارنده رفلاکس

۲۰ میلی گرم روزانه طبق نظر پزشک.

زخم معده

۲۰ میلی‌گرم روزانه به مدت ۶ هفته.

زخم دوازدهه

۲۰ میلی‌گرم روزانه به مدت ۴ هفته.

درمان هلیکوباکتر پیلوری

۲۰ میلی‌گرم دو بار در روز به مدت ۷ تا ۱۴ روز همراه با آنتی بیوتیک

سندرم زولینگر–الیسون

شروع درمان معمولاً با ۶۰ میلی‌گرم در روز است و مقدار مصرف توسط پزشک تنظیم می‌شود.

فراموش کردن یک نوبت

به محض یادآوری مصرف کنید. اگر زمان نوبت بعدی نزدیک است، از مصرف دوز فراموش‌شده صرف‌نظر کنید. از مصرف دو برابر دارو خودداری نمایید.

قطع مصرف

حتی اگر علائم بیماری برطرف شد، بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع نکنید.

۴– عوارض جانبی احتمالی

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود. اگر چه همه‌ی این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز هر یک از اثرات جانبی زیر بلافاصله به پزشک اطلاع دهید.

در صورت مشاهده موارد زیر فوراً به پزشک مراجعه کنید

واکنش آلرژیک شدید (نظیر تورم ناگهانی صورت، تنگی نفس، کاهش فشار خون که منجر به غش گردد)، عفونت‌های مکرر (همراه تب و گلودرد)، خونریزی یا کبودی غیرطبیعی، زخم دهان، تاول شدید پوستی (نادر).

عوارض شایع

سر درد، سرگیجه، بی‌خوابی، درد شکم، تهوع، استفراغ، یبوست، اسهال، نفخ، درد پشت، ضعف، پولیپ خوش‌خیم معده، عفونت‌ها، آب ریزش بینی، سرفه و یا زخم گلو

عوارض با شیوع کمتر

خواب‌آلودگی، برونشیت، سینوزیت، خشکی دهان، سوءهاضمه، بشورات پوستی، درد عضلات و مفاصل، عفونت ادراری، شکستگی استخوان، اختلال عملکرد کبد

عوارض نادر

کاهش اشتها، افسردگی، اختلال بینایی، زخم دهان، یرقان، مشکلات کلیوی، افزایش وزن، کاهش پلاکت یا گلبول سفید

سایر عوارض

بزرگ شدن پستان در مردان، احتباس مایعات، کاهش سدیم خون، کاهش منیزیم خون در مصرف طولانی‌مدت، کاهش پتاسیم یا کلسیم خون، التهاب روده همراه اسهال

۵–شرایط نگهداری دارو

• دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

• دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

۶– بسته بندی

هر جعبه محتوی یک بطری پلاستیکی ۲۸ عددی از جنس HDPE و یا دو بلیستر ۱۴ عددی قرص انتریک کوتد راپیرازول–ناژو ۲۰ می‌باشد.





تهیه شده در لابراتوارهای شرکت داروسازی بهداشتی، آرایشی

ایران ناژو تهران – ایران

www.irannajo.ir

info@irannajo.com

تلفن انتقادات و پیشنهادات: ۰۲۱۸۸۷۳۸۷۳–۰۹۸۲۱

فکس: ۰۲۱۸۸۷۴۰۶۴۴–۰۹۸۲۱

E.C.Tablet
Rabeprazole-Najo 20

Rabeprazole

Each Rabeprazole-Najo 20 EC Tablet Contains: Rabeprazole Sodium 20 mg

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

What is in this leaflet

1. What Rabeprazole-Najo 20 is and what it is used for
2. What you need to know before you take Rabeprazole-Najo 20
3. How to take Rabeprazole-Najo 20
4. Possible side effects
5. How to store Rabeprazole-Najo 20
6. Contents of the pack and other information

1. What Rabeprazole-Najo 20 is and what it is used for

Rabeprazole-Najo 20 tablets contain the active ingredient Rabeprazole sodium. This belongs to a group of medicines called ‘Proton Pump Inhibitors’ (PPIs). They work by lowering the amount of acid that your stomach produces.

Rabeprazole-Najo 20 tablets are used to treat the following conditions:

- Gastroesophageal reflux disease (GERD), which can include heartburn.
- Ulcers in your stomach or the upper part of your gut (intestine). If these ulcers are

infected with bacteria called Helicobacter pylori (H. Pylori), you will also be given antibiotics. Using Rabeprazole-Najo 20 tablets and antibiotics together gets rid of the infection and makes the ulcer heal. It also stops the infection and ulcer from coming back.

- Zollinger-Ellison Syndrome where your stomach produces too much acid.

2. What you need to know before you take Rabeprazole-Najo 20

Do not take Rabeprazole-Najo 20 if

- You are allergic (hypersensitive) to Rabeprazole sodium.
- You are breast feeding

Warnings And Precautions

Talk to your doctor or pharmacist before or during use of Rabeprazole-Najo 20 if:

- You are allergic to other proton pump inhibitor medicines.
- You have ever had liver problems.
- You have a stomach tumour.
- If you are taking atazanavir for HIV infection.
- If you have risk factors for reduced Vitamin B₁₂ and receive long term treatment with Rabeprazole sodium.
- If you have ever had a skin reaction after treatment with a medicine similar to Rabeprazole that reduces stomach acid.
- You are due to have a specific blood test (Chromogranin A).
- If you have ever had inflammation in your kidney after treatment with this medicine.

Seek medical advice immediately if you experience any of the following:

- Skin rash, particularly in areas exposed to sunlight.
- Joint pain accompanied by a skin rash.
- Reduced urine volume or blood in the urine.
- Severe watery or bloody diarrhoea, especially with symptoms such as fever or abdominal pain.

Children

Rabeprazole-Najo 20 should not be used in children.

Long-term use

Taking a proton pump inhibitor like Rabeprazole-Najo 20, especially over a period of more than one year, may slightly increase your risk of fracture in the hip, wrist or spine. Tell your doctor if you have osteoporosis or if you are taking corticosteroids.

If you are on Rabeprazole-Najo 20 for more than three months it is possible that the levels of magnesium in your blood may fall. Low levels of magnesium can be seen as fatigue, involuntary muscle contractions, dizziness, increased heart rate. If you get any of these symptoms, please tell your doctor promptly. Low levels of magnesium can also lead to a reduction in potassium or calcium levels in the blood. Your doctor may decide to perform regular blood tests to monitor your levels of magnesium.

Taking Other Medicines

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines, especially:

- Ketoconazole
 - Itraconazole
 - Atazanavir
 - High-dose Methotrexate
 - Any other prescription or over-the-counter (OTC) medicines
 - Herbal medicines or herbal supplements
- Rabeprazole may affect the efficacy of these medicines.

Pregnancy and Breast Feeding

Do not use Rabeprazole-Najo 20 if you are breast-feeding or planning to breast-feed.

If you are pregnant, ask your doctor for advice before taking this medicine.

Driving and using machines

You may feel sleepy while taking Rabep-

razole-Najo 20. If this happens, do not drive or use any tools or machines.

Rabeprazole-Najo 20 contains sodium

This medicine contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per tablet, that is to say essentially ‘sodium-free’.

3. How to take Rabeprazole-Najo 20

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Taking This Medicine

Only remove a tablet from the blister strip or the bottle when it is time to take your medicine.

Swallow your tablets whole with a drink of water. Do not chew or crush the tablets. Take the tablet in the morning before eating.

Adults and older people

For gastroesophageal reflux disease (GERD)

Treatment of more severe symptoms (erosive or ulcerative GERD)

- The usual dose is one tablet once a day for 4 to 8 weeks

Long-term treatment of symptoms (GERD maintenance)

- The usual dose is one tablet once a day for as long as your doctor has told you

For ulcers of the stomach (peptic ulcers)

- The usual dose is one tablet once a day for 6 weeks

For ulcers of the intestine (duodenal ulcers)

- The usual dose is one tablet once a day for 4 weeks

For ulcers caused by H. Pylori infection

- The usual dose is one tablet twice a day for seven days

- Your doctor will also tell you to take antibiotics

Zollinger-Ellison Syndrome where

excess acid is produced in the stomach

- The usual dose is three tablets once a day to start with

If you forget to take Rabeprazole-Najo 20

- If you forget to take a dose, take it as soon as you remember it. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and continue as usual.

- Do not take a double dose (two doses at the same time) to make up for a forgotten dose.

If you stop taking Rabeprazole-Najo 20

- Relief of symptoms will normally occur before the ulcer has completely healed. It is important that you do not stop taking the tablets until told to do so by your doctor.

4. Possible side effects

Like all medicines, Rabeprazole-NAJO can cause side effects, although not everybody gets them.

Stop taking the medicine and seek immediate medical attention if you experience any of the following:

Severe allergic reactions such as sudden swelling of the face, lips, tongue or throat, difficulty breathing or swallowing, Frequent Infections such as Fever with a sore throat, Mouth ulcers, Unusual bruising or bleeding, Severe blistering skin reactions (rare).

Common side effects

Headache, Dizziness, Difficult sleeping, Abdominal pain, Nausea, Vomiting, Constipation, Diarrhoea, Flatulence, Back pain, Weakness, Benign gastric polyps, Infectious, Cough, Runny nose or sore throat

Less Common Side Effects

Drowsiness, Bronchitis, Sinusitis, Dry mouth, Indigestion (dyspepsia), Skin rash, Muscle and joint pain, Urinary tract infection, Bone fractures, Changes in liver

function.

Rare Side Effects

Loss of appetite, Depression, Visual disturbances, Mouth ulcers, Jaundice, Kidney disorders, Weight gain, Decreased white blood cell or platelet counts.

Other Possible Side Effects

Breast enlargement in men (gynaecomastia), Fluid retention, Low blood sodium levels (hyponatraemia), Low blood magnesium levels during long-term treatment (hypomagnesaemia), Low blood potassium or calcium levels, Inflammation of the bowel associated with diarrhoea (microscopic colitis)

5. How to store Rabeprazole-Najo 20

Protect from light and moisture. Store at temperature below 30°C.

Keep out of reach of children.

6. PACKAGING

Each package of Rabeprazole-Najo 20 contains 28 E.C.tablets. The medicine is supplied in blister or a HDPE bottle.

REFERENCE

<https://www.medicines.org.uk/Pariet®> Leaflet

Issue Date: 08.2026



Iran Najo

IRAN NAJO PHARMACEUTICAL COMPANY

www.irannajo.ir

info@irannajo.com

Tel: +9821-88738730 Fax: +9821-88740644